93 C

**Herbst 1865.** En gros- **Frühjahr 1866.**

Quedlinburg hat **Eisenbahn-** und **Telegraphen-Station.**

# Preis-Verzeichniß

über

# Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumen-Sämereien

in der

## Samenhandlung und Kunstgärtnerei

von

# Gebrüder Dippe

in Quedlinburg.

Für **Postvorschüsse** betragen die Gebühren ½ *Sgr.* pro Thaler, und für mittelst **Postanweisungen** zu bewirkende **baare Einzahlungen** im Preußischen Postgebiete ohne Unterschied der Entfernung 1 *Sgr.* bis 25 *Rt.* excl. und 2 *Sgr.* von 25 bis 50 *Rt.*

Bibliotheek der Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

Unser diesjähriges Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichend, bemerken wir, daß unser Geschäft unter unserer persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb wir jedem unserer geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern. Bei Ausführung der werthen Befehle sorgen wir für dauerhafte Verpackung, und berechnen für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, werden jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitten uns franco, und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Die uns noch unbekannten resp. Besteller ersuchen wir, den Betrag ihrem Auftrage baar beizufügen, oder mit hinlänglicher Rimesse zu begleiten, oder auch uns zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

***Gebrüder Dippe.***

**Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. angesetzt, und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechnen wir die Lothpreise. — Louisd'or und andere Goldmünzen, so wie ausländische Cassenanweisungen werden nach Cours angenommen.**

| | à *Rt.* | *tl.* *Sgr.* | à *Sgr.* | *Pfg.* |
|---|---|---|---|---|
| **Küchenkräuter.** | | | | |
| Anis | — | 6 | — | 6 |
| Basilikum, grüner großer gewöhnlicher | — | 12 | — | 9 |
| — feiner grüner | — | 28 | 1 | 6 |
| Beete oder großer breitblättriger Mangold | — | 6 | — | 6 |
| — mit scharlachrothem Blattstiele | — | 10 | 1 | — |
| — mit carmoisinrothem Blattstiele | — | 10 | 1 | — |
| — mit goldgelbem Blattstiele | — | 10 | 1 | — |
| — Silberbeete mit weißem Blattstiele | — | 10 | 1 | — |
| — letzte 4 Sorten gemischt | — | 8 | 1 | — |
| Borretsch oder Gurkenkraut | | 3 | | |
| Cardobenedicten | — | 6 | — | 6 |
| Coriander | — | 4 | — | 6 |
| Dill | — | 5½ | — | 6 |
| Erdmandeln | — | 16 | — | 9 |
| Fenchel, ordinärer | — | 5 | — | 6 |
| — süßer Bologneser | — | 8 | — | 6 |
| Gartenmelde, gelbe | — | 4 | — | 6 |
| — blutrothe | — | 4 | — | 6 |
| Isop | — | 12 | — | 9 |
| Kümmel | — | 4½ | — | 6 |
| Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut | — | 12 | — | 9 |
| Körbel, extra krauser | — | 4 | — | 6 |
| — gewöhnlicher | — | 3 | — | 6 |
| — großer spanischer | 1 | — | 1 | 6 |
| Körbelrübe, delicat | — | 15 | — | 9 |
| Lavendel | — | 13 | — | 9 |
| Liebesapfel mit großer Frucht | — | 25 | 1 | 6 |
| Liebstock | — | 25 | 1 | 6 |
| Löffelkraut, Cochlearea officinalis | — | 18 | 1 | — |
| Majoran, französischer Stauden- | — | 16 | 1 | — |
| Malve, krausblättrige | — | 22½ | 1 | 6 |
| Melisse, Citronen- | 1 | 10 | 1 | 9 |
| Petersilie, gewöhnliche Schnitt- | — | 4 | — | 6 |
| — extra krause | — | 5 | — | 6 |
| — ganz extra krause Zwerg- | — | 5½ | — | 6 |
| Pfeffer, großer spanischer | 1 | 10 | 2 | — |
| Pimpinelle | — | 4 | — | 6 |
| Porro, früher Sommer-, oder französischer dicker | — | 12 | — | 9 |
| — großer dickpolliger Winter- | 1 | — | 1 | 6 |
| — extra großer dicker Brabanter Winter- | 1 | 6 | 1 | 9 |
| Portulak, gelber | — | 19 | 1 | — |
| — grüner | — | 19 | 1 | — |
| Raute oder Weinraute | — | 12 | — | 9 |
| Rosmarin | 1 | 15 | 2 | 3 |
| Salbei | — | 25 | 1 | 6 |
| Sauerampfer, großblättriger | — | 8 | — | 6 |
| Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll- | — | 25 | 1 | 6 |
| — großer glatter Leipziger Knoll-, früheste Sorte | 1 | — | 1 | 6 |
| — glatter krausblättriger Knoll- | — | — | 2 | — |
| — krausblättriger Schnitt- | — | 20 | 1 | — |
| — weißer englischer Bleich- | 1 | — | 1 | 6 |
| Senf, gelber | — | 3 | — | 6 |
| — gelber und brauner melirt | — | 2½ | — | 6 |
| — brauner holländischer | — | 5 | — | 6 |
| Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen | — | 4 | — | 6 |
| — großer rund- und breitblättriger mit scharfem Samen | — | 4 | — | 6 |
| — peruanischer, Chenopodium Quinoa | — | 6 | — | 6 |
| — de Gaudry, großblättriger | — | 5 | — | 6 |
| — Neuseeländer, Tetragonia expansa | — | 8 | — | 6 |
| — englischer immerwährender Winter-, Rumex patientia | — | 6 | — | 6 |
| Thymian, deutscher oder Winter- | 1 | 10 | 2 | — |
| — Sommer- oder französischer | 1 | 8 | 2 | — |
| Wermuth | 1 | 5 | 2 | — |

### Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.

*w.* bedeutet weißer und *s.* schwarzer Same.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kopfsalat, früher gelber Steinkopf-, *w.* | zum Treiber | 1 | — | 1 | 6 |
| — — grüner — *w.* | zum Treiber | 1 | 8 | 1 | 9 |
| — — gelber Eier-, *w.* | zum Treiber | 1 | 8 | 1 | 9 |
| — — holländischer Bruyn geel, *w.* | zum Treiber | 1 | — | 1 | 6 |
| — großer gelber asiatischer, *w.* | | 1 | 12 | 1 | 9 |
| — — bunter Forellen-, *w.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| Kopfsalat, großer Zucker- oder Schwedenkopf-, *w.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — — gelber Dresdener, *w.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — — — Winter-, *w.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — — brauner Winter-, *w.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — — rothkantiger Prinzenkopf, *w.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — — gelber Prahl-, *s.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — — Berliner, *s.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — kleiner englischer Blut-Forellen-, *s.* | | 1 | — | 1 | 6 |
| — großer brauner Haarlemer, *s.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — Lactuca dicephala, außerordentlich großer, *s.* | | 1 | 8 | 1 | 9 |
| — Cyrius, oder gelber Riesen-Mogul, *w.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — [illegible] englischer Prinzenkopf, *w.* | | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — großer festköpfiger Perpignaner, *w.* | | 2 | — | 2 | 6 |
| — Montrö, großer rothkantiger, *w.* | | 1 | 8 | 1 | 9 |
| — mehrere Sorten für's freie Land gemischt | | 1 | — | 1 | 6 |

### Schnitt- oder Stechsalat.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Latuke, frühe gelbe runde, *w.* | — | 12 | — | 9 |
| — gelbe ganz krause, *s.* | — | 12 | — | 9 |
| Kresse, gelbe breitblättrige englische | — | 3 | — | 6 |
| — grüne extra krause | — | 4 | — | 6 |
| — — gewöhnliche Garten- | — | 3 | — | 6 |
| — Brunnen- oder Wasser-, echte zarte Erfurter | — | — | 8 | — |
| Rapunzel, Feldcrop oder Schafmäulchen à 100 *tl.* 34 *Rt.* | — | 11 | — | 9 |
| Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder- | — | 12 | — | 9 |
| — — von Natur ganz gelbe extra krause | — | 16 | — | 9 |
| — — grüne breite Casseler | — | 12 | — | 9 |
| — — sehr feine krause moosartige | 1 | — | 1 | 6 |
| Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler | — | 25 | 1 | 6 |

### Kopfkohl mit schlichten Blättern.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispitz- | 2 | — | 2 | 9 |
| — extra früher weißer echter Yorker | 1 | 10 | 2 | — |
| — kleiner früher weißer runder Erfurter | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — spitzer weißer Winnigstädter | 2 | 10 | 3 | — |
| — großer platter weißer Magdeburger | 1 | 10 | 2 | — |
| — großer platter weißer echter Braunschweiger | 3 | — | 4 | — |
| — früher schwarzrother Cabus- | 2 | — | 2 | 9 |
| — später blutrother Cabus- | 1 | 20 | 2 | 6 |

### Blumenkohl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Blumenkohl, **allerfrühester Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, ganz echt** à 100 K. 3½ *Sgr.* | — | — | 60 | — |
| — **allerfrühester Erfurter Zwerg-**, von auswärts aus zuverlässiger Quelle bezogen, ebenfalls schön | 12 | — | 14 | — |
| — **früher Berliner Treib-**, eine ganz vorzügliche Sorte, zum Treiben, wie für's freie Land sehr empfehlenswerth | 8 | — | 9 | — |
| — frühester großer cyprischer | 6 | 15 | 7 | 6 |
| — früher großer asiatischer | 6 | 15 | 7 | 6 |
| — — — englischer | 6 | 15 | 7 | 6 |
| — später großer asiatischer | 6 | 15 | 7 | 6 |
| — — — englischer | 6 | 15 | 7 | 6 |
| — — von Walchern | 7 | — | 8 | — |
| — — Stadtholder | 7 | — | 8 | — |
| Brocoli, französischer weißer | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — — violetter | 1 | 5 | 1 | 9 |

### Savoyerkohl oder Wirsing.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Wirsing, Chou Marcelin | — | — | 2 | 6 |
| — extra früher grüner krauser Wiener | 1 | 10 | 2 | — |
| — — — — — Ulmer | 1 | 10 | 2 | — |
| — großer mittelfrüher krauser grüner | 1 | — | 1 | 6 |
| — — später krauser grüner | 1 | — | 1 | 6 |
| — — krauser später Drumhead | 1 | 5 | 1 | 9 |
| — früher krauser gelber Blumenthaler | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — de Vertus, sehr großer später | 1 | 20 | 2 | 6 |
| Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing | — | 22 | 1 | 3 |
| — verbesserter niedriger | — | 25 | 1 | 6 |

### Blätterkohl.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Blätterkohl, niedriger grüner extra krauser | — | 7 | — | 6 |
| — — schwarzbrauner extra krauser | — | 9 | — | 6 |
| — hoher grüner extra krauser | — | 16 | — | 9 |
| — — schwarzbrauner extra krauser | — | 16 | — | 9 |

| | | à Rt. | à Sgr. | à Sgr. | à Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|
| Blätterkohl, | rothgescheckter | — | — | 4 | — |
| — | weißgescheckter | — | — | 4 | — |
| — | hoher blauer Riesen-, 6—8 Fuß hoch | 1 | 10 | 2 | — |
| — | großer grüner Baum- oder Kuh-Kohl | — | 15 | — | 9 |
| — | brauner Schnitt- | — | 12 | — | 9 |
| — | grüner — | — | 12 | — | 9 |
| — | blauer schlichter Winter- oder Frühlingskohl | — | 15 | — | 9 |

## Oberkohlrabi.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlrabi, | früher kleinblättriger weißer Wiener Glas-, 1. Qualität | 2 | 15 | 3 | 3 |
| — | — — — — — 2. — | 1 | 20 | 2 | 6 |
| | früher feiner weißer englischer Glas-, 1. Qualität | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — | — — — — — 2. — | 1 | 10 | 2 | — |
| — | mittelfrüher weißer Glas- | 1 | 8 | 2 | — |
| — | großer später weißer Glas- | 1 | 8 | 2 | — |
| — | früher feiner blauer Wiener Glas- | 2 | 15 | 3 | 3 |
| — | — — — englischer Glas- | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — | später blauer Glas- | 1 | 8 | 2 | — |

## Kohlrüben, Steckrüben, auch Wrucken genannt.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohlrüben, | große glatte gelbe à 100 Ct. 25 Rt. | — | 8 | — | 6 |
| — | — — weiße à 100 Ct. 34 Rt. | — | 11 | — | 9 |
| — | große glatte gelbe rothköpfige Laing's à 100 Ct. 28 Rt. | — | 9 | — | 6 |
| — | — rothgrauköpfige glatte gelbe englische Riesen- à 100 Ct. 28 Rt. | — | 9 | — | 6 |
| — | — — — weiße — — à 100 Ct. 34 Rt. | — | 11 | — | 9 |
| — | glatte weiße kurzlaubige Schmalz- à 100 Ct. Rt. | — | 12 | — | 9 |
| — | — gelbe Schmalz-, sehr empfehlenswerth à 100 Ct. 28 Rt. | — | 9 | — | 6 |
| — | große weiße pommersche Kannen-, eine sehr ergiebige und in Pommern beliebte Sorte | — | 20 | 1 | — |

☞ Unser Kohlrübensamen ist nur von ausgepflanzten, schön geformten, wenig Wurzeln bildenden Rüben gewonnen, und der Preis dieser kostspieligeren Cultur kaum angemessen.

## Wurzeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Möhren, | allerkürzeste früheste rothe Pariser Treib-Carotten | — | 20 | 1 | — |
| — | extra frühe feine kurze rothe Douwiker Treib-Carotten, empfehlenswertheste Sorte, echt à 100 Ct. 45 Rt. | — | 15 | — | 9 |
| — | früheste feine lange rothe Hornsche Carotten à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | frühe feine halblange rothe Bardowiker Carotten à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | — — lange rothe Braunschweiger Carotten à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | lange feine rothe süße Altringham à 100 Ct. 34 Rt. | — | 11 | — | 9 |
| — | große lange feine rothe à 100 Ct. 32 Rt. | — | 10 | — | 9 |
| — | feine ganz weiße | — | 12 | — | 9 |
| — | große weiße grünköpfige Riesen- à 100 Ct. 16 Rt. | — | 5½ | — | 6 |
| — | verbesserte große lange weiße grünköpf. Riesen-, z. Viehf. à 100 Ct. 18 Rt. | — | 6 | — | 6 |
| — | sehr große orangengelbe (rothe) — — — à 100 Ct. 36 Rt. | — | 12 | — | 9 |
| — | große lange rothe ordinäre, zum Viehfutter à 100 Ct. 32 Rt. | — | 10 | — | 9 |
| — | — dicke gelbe Saalfelder à 100 Ct. 36 Rt. | — | 12 | — | 9 |
| Pastinaken, | große lange weiße à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | 6 |
| — | runde weiße à 100 Ct. Rt. | — | 5 | — | 6 |
| Petersilienwurzeln, | lange späte à 100 Ct. 15 Rt. | — | 5 | — | 6 |
| — | frühe dicke Zucker- à 100 Ct. 15 Rt. | — | 5 | — | 6 |
| Haferwurzeln | | — | 16 | — | 9 |
| Scorzoner- oder Schwarzwurzeln | | — | 14 | — | 9 |
| Zuckerwurzeln | | — | 25 | 1 | 6 |
| Rapuntica | | — | 6 | — | 6 |
| Cichorien, | beste lange Magdeburger à 100 Ct. 32 Rt. | — | 10 | — | 6 |
| — | buntblättrige oder Forellen- | — | 12 | — | 9 |

## Zipollen oder Zwiebeln.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zwiebeln, | gelbe runde harte holländische | — | 25 | 1 | 6 |
| — | schwefelgelbe runde harte holländische | 1 | 10 | 1 | 9 |
| — | blaßrothe — — — | 1 | — | 1 | 6 |
| — | blutrothe — — — | 1 | — | 1 | 6 |
| — | silberweiße — — — | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — | dunkelrothe — — Braunschweiger | 1 | — | 1 | 6 |
| — | lange gelbe Birn- | — | 25 | 1 | 6 |
| — | allergrößte Madeira oder Riesen- | 1 | — | 1 | 6 |
| Winterhecke-Zwiebeln | | 1 | — | 1 | 6 |
| Knoblauchzwiebeln | | — | 6½ | — | 6 |
| Steckzwiebeln, | getrocknete, in mehreren Sorten à 1000 St. 18 Sgr. | — | — | — | — |

## Rüben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mairüben, | frühe plattrunde weiße à 100 Ct. 32 Rt. | — | 10 | — | 6 |
| — | — — — gelbe à 100 Ct. 32 Rt. | — | 10 | — | 6 |
| Herbstrüben, | große lange weiße rothköpfige à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | — — — — grünköpfige à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | — — — — grün- und rothköpfige gemischt à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | lange gelbe Bortfelder à 100 Ct. Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | schwarze runde | — | 13 | — | 9 |
| — | runde weiße à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | — — rothköpfige à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | — gelbe Wilhelmsburger à 100 Ct. 40 Rt. | — | 13 | — | 9 |
| — | kleine echte märkische à 100 Ct. Rt. | — | 14 | — | 9 |
| Englische Futterrüben, | 6 der besten Sorten, jede separat | — | 8 | — | 6 |
| — | dieselben gemischt | — | 7 | — | 6 |

## Runkelrüben.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zucker-Runkelrüben, | echte weiße, beliebteste Sorte zur Zuckerfabrikation à 100 Ct. 10 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | weiße Imperial-, **echt**, von sehr schöner Form und sehr zuckerreich à 100 Ct. 12 Rt. | — | 4 | — | — |
| Futter-Runkelrüben, | große lange rothe, lang aus der Erde wachsende à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | — |
| — | — — — halb aus der Erde wachsende à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | — |
| — | — — gelbe, aus der Erde wachsende à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | — |
| — | Dippe's halblange rothe Riesen-Pfahl-. Die zur Samenzucht bestimmten Rüben dieser Sorte haben im October 1864 stark vom Frost gelitten und in Folge dessen ist die Ernte davon sehr dürftig ausgefallen, weßhalb wir bitten, bei Bedarf von großen Quantitäten andere Sorten zu wählen à 25 Ct. 6 Rt. | — | 8 | — | — |
| — | runde gelbe Oberndorfer, echt à 100 Ct. 16 Rt. | — | 5½ | — | — |
| — | — rothe — — à 100 Ct. 18 Rt. | — | 6 | — | — |
| — | dicke gelbe, sogenannte Klumpen à 100 Ct. 11 Rt. | — | 4 | — | — |
| — | gelbe flaschenförmige Riesen- à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | — |
| — | rothe — — à 100 Ct. 18 Rt. | — | 6 | — | — |

## Rotherüben oder schwarzrothe Beete zum Einmachen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rotherüben, | echte schwarzrothe à 100 Ct. 14 Rt. | — | 5 | — | 6 |
| — | feine — etwas aus der Erde wachsende à 100 Ct. 16 Rt. | — | 5½ | — | 6 |
| — | runde schwarzrothe | — | 8 | — | 6 |

## Monats-Radies und Rettig.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radies, | frühe **scharlachrothe** runde kurzlaubige | — | 12 | — | 9 |
| — | — weiße — — | — | 10 | — | 9 |
| — | — rosenrothe — — | — | 10 | — | 9 |
| — | — violette — — | — | 9 | — | 6 |
| — | — gelbe — — | — | 12 | — | 9 |
| — | — länglichrunde rosenrothe | — | 10 | — | 9 |
| — | lange feine rosenrothe | — | 9 | — | 6 |
| — | — — weiße | — | 9 | — | 6 |
| Rettig, | schwarzer runder Winter- | — | 6 | — | 6 |
| — | — langer Erfurter Winter- | — | 6 | — | 6 |
| Rettig, | weißer langer Winter- | — | 6 | — | 6 |
| — | rothschaliger Herbst- | — | 6 | — | 6 |
| — | schwarzer runder Sommer- | — | 6 | — | 6 |
| — | gelber Wiener Mai- | — | 8 | — | 6 |

## Gurken.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurken, | extra lange grüne Schlangen- | 2 | 20 | 3 | 6 |
| — | lange weiße Schlangen- | 2 | 20 | 3 | 6 |
| — | frühe lange weiße holländische | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — | große lange grüne | 1 | 25 | 2 | 6 |
| — | mittellange grüne | 1 | 15 | 2 | 3 |
| — | kleine frühe grüne Trauben- | — | 20 | 1 | 3 |
| — | lange chinesische grüne Schlangen- à 25 K. 1 Sgr. | 4 | — | 5 | — |
| — | — — grünbleibende — 1—2' lang ... à 25 K. 1 Sgr. | 5 | — | 6 | — |
| — | kleine grüne russische, sehr delicat zum Einmachen wie zum Salat *) | 1 | — | 1 | 6 |

*) Diese von uns in voriger Saison mehrfach offerirte und eingeführte Sorte hat sich ausgezeichnet bewährt, da sie überreich trägt und weit früher Früchte bringt als die langen Gurkensorten.

## Treibgurken, die ausgezeichnetsten Sorten.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gurken, | Non plus ultra à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Man of Kent à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | Gladiator à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | Roman Emperor à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Victory of Bath à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Walker's Traveller à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Cuthill's blackspine à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Race Horse à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | semperfructifera, die echte immertragende à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | grüne Schlangen-Treib-, extra à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | Preis von London à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | blaßgrüne brasilianische à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | Sillig's weiße Beet- à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen- à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | — neue glatte grüne à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | allerfrüheste volltragende Treib- à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | neue schneeweiße Arnstädter Riesen-, extra à 25 K. 3 Sgr. | — | — | 30 | — |

## Melonen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melonen, | vorzüglich große Netz- à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 12 | — |
| — | — — Netz-Cantaloupe à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | im Freien reifende amerikanische à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 25 | — |
| — | gewürzreiche Chito-, wird nur 3" lang, sehr volltragend à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | Kabul- à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | Queen Victoria à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 20 | — |
| — | Ananas à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | von Malta, genetzt, mit grünem Fleisch, für Sommer und Winter, sehr delicat und volltragend à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | allerfrüheste volltragende runde Netz-, sehr delicat à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | außer vorstehenden 9 vorzüglichen Sorten noch 10 andere, jede separat à 25 K. 2 Sgr. | — | — | 15 | — |
| — | in guter Melange à 25 K. 1½ Sgr. | — | — | 8 | — |
| — | gelbe französische Land- | — | 20 | 1 | — |
| — | weiße — — | — | 18 | 1 | — |

## Kürbiß-Arten zum Verspeisen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kürbiß, | großer birnförmiger gelber Riesen- | 4 | — | 5 | — |
| — | — blaßgelber Riesen-Melonen- | 3 | — | 4 | — |
| — | — weißer — — | 4 | — | 5 | — |
| — | — rother — — | 3 | — | 4 | — |
| — | — grüner — — | 3 | — | 4 | — |
| — | — dunkelgelber — — à Pr. 1 Sgr. | 3 | — | 4 | — |
| — | vegetable Marrow, engl. Schmeer-, echt | 2 | — | 3 | — |
| — | von Valparaiso, dunkelroth | — | — | 5 | — |
| — | — — gelb mit weißen Streifen | — | — | 5 | — |
| — | — — grün mit gelben — | — | — | 5 | — |
| — | — — dunkelroth mit weißlichen Streifen à Pr. 1 Sgr. | — | — | 5 | — |
| — | — — rosa mit grün gestreift à Pr. 1 Sgr. | — | — | 5 | — |
| — | gelber Mandel- | 4 | — | 5 | — |
| — | weißer — | 4 | — | 5 | — |
| — | großer gelber Speise- | — | 16 | 1 | — |
| — | — grüner — | — | 16 | 1 | — |
| — | — Feld- oder Futter- | — | 15 | 1 | — |
| Speise-Kürbiß | in Melange | 1 | 15 | 2 | 6 |

## Zier-Kürbisse.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Sortiment | in 24 Sorten und sehr zierlichen Formen, jede separat | — | — | 4 | — |
| Dieselben | in guter Melange à Pr. 1 Sgr. | 1 | 15 | 2 | — |
| Zier-Kürbisse | in den gewöhnlichsten Sorten gemischt | 1 | — | 1 | 6 |
| — | kleiner Stachelbeer- à Pr. 1 Sgr. | — | — | 8 | — |
| — | (Angura-) schwarzkörniger bunter sicilianischer, grün mit weißen Flecken, sehr weitrankend und ganz vorzüglich zur Bekleidung von Lauben | 3 | — | 4 | — |

## Erbsen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schal-Erbsen, | **Daniel O'Rourke**, allerfrüheste volltragende, empfehlenswertheste, 3' hoch à 100 Ct. 10 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | früheste Gutenberger Mai-, 3' hoch à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | **Prince Albert**, früh und volltragend, 3' hoch à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | frühe volltragende Folger-, 3' hoch à 100 Ct. 7 Rt. | — | 2½ | — | — |
| — | allerfrüheste Buchsbaum-, ½' hoch à 100 Ct. 12 Rt. | — | 4 | — | — |
| — | niedrige grünbleibende Caper-, 2—3' hoch ... à 100 Ct. 7 Rt. | — | 2½ | — | — |
| — | großschotige Schnabel- oder Sabel-, 4' hoch à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | **Paradise**, neu, sehr langschotig und volltragend, 4' hoch à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | früheste Bischofs-, 1—1½' hoch à 100 Ct. 7 Rt. | — | 2½ | — | — |
| — | langschotige Bischofs-, 1' hoch à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | späte Gold- oder Wachs-, 4' hoch à 100 Ct. 9 Rt. | — | 3 | — | — |
| — | **Eugenie (Alliance)**, niedrige weiße Mark-, 2' hoch, sehr reichtragend à 100 Ct. 10 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | **Champion of England**, eine ganz vorzüglich volltragende grüne Mark-, 3—4' hoch à 100 Ct. 10 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | **Early Wonder**, neue frühe, vorzüglich volltragende und sehr empfehlenswerthe Sorte, 1½—2' hoch à 100 Ct. 7 Rt. | — | 2½ | — | — |
| Zucker-Erbsen, | frühe große krummschotige oder englische Sabel-, 4' hoch à 100 Ct. 15 Rt. | — | 5 | — | — |
| — | neue krummschotige Sabel- mit wachsgelben Schoten, 4' hoch à 100 Ct. 9 Rt. | — | 7 | — | — |
| — | frühe niedrige volltragende, 1½' hoch à 100 Ct. 9 Rt. | — | 3 | — | — |
| — | früheste — — 1' hoch | — | 5 | — | — |
| — | de grace, ½' hoch, zum Treiben | — | 10 | — | — |
| — | Spargel- oder Flügel-, 1' hoch | — | 4 | — | — |

## Krupbohnen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Krupbohnen, | hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert- à 100 Ct. 12 Rt. | — | 4 | — | — |
| — | frühe extra lange breite weiße Schwert- à 100 Ct. 11 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | — lange breite weiße Schwert- à 100 Ct. 9 Rt. | — | 3 | — | — |
| — | allerfrüheste weiße Schwert-, zum Treiben à 100 Ct. 9 Rt. | — | 3 | — | — |
| — | ganz kleine feine weiße Zucker-Perl- à 100 Ct. 14 Rt. | — | 4½ | — | — |
| — | feine weiße Zucker- oder Butter- à 100 Ct. 11 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | neue feine weiße Zucker-Brech- à 100 Ct. 11 Rt. | — | 3½ | — | — |
| — | früheste rothbunte Adler- à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | — gelbe englische Treib- à 100 Ct. 5 Rt. | — | 2 | — | — |
| — | weiße Nieren- à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | frühe gelbe Prinzeß- à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |
| — | Flageolet à 100 Ct. 8 Rt. | — | 2¾ | — | — |

| | | | à Thl. Rc. | à Thl. Sgr. | à Ltk. Sgr. | à Ltk. Pfg. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krupbohnen, | weiße Wachs- mit grünen Schoten | à 100 Tl. 8 Rc. | — | 2¾ | — | — |
| — | hundert für eine | à 100 Tl. 9 Rc. | — | 3 | — | — |
| — | früheste schwarze Neger- | à 100 Tl. 9 Rc. | — | 3 | — | — |
| — | Kafferländer (als Nonpareille empfohlen), sehr ergiebig und grün sowohl wie getrocknet zum Kochen ausgezeichnet... | à 100 Tl. 8 Rc. | — | 2¾ | — | — |
| — | allerfrüheste, volltragende bunte Ilsenburger, zum Treiben wie für's freie Land ganz vorzüglich und, da diese Sorte gegen Witterungs-einflüsse sehr unempfindlich ist, für rauhe Gebirgsgegenden gleichfalls zu empfehlen | à 100 Tl. 6 Rc. | — | 2 | — | — |

## Stangenbohnen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stangenbohnen, | extra lange breite weiße Schlachtschwert- | à 100 Tl. 24 Rc. | — | 8 | — | — |
| — | mittelbreite weiße Schwert- | à 100 Tl. 22 Rc. | — | 7 | — | — |
| — | kleine feine weiße Zucker-Perl-, ohne Fasern | à 100 Tl. 24 Rc. | — | 8 | — | — |
| 25 — | Riesen-Zucker-Brech-, extra schön | à 100 Tl. 14 Rc. | — | 5 | — | — |
| — | neue Riesen-Zucker-Brech-, mit **wachsgelben** Schoten und weißen Bohnen, ganz extra (Dippe) | à 100 Tl. 24 Rc. | — | 8 | — | — |
| — | schwarze römische Wachs-, mit gelben Schoten | à 100 Tl. Rc. | — | 8 | — | — |
| — | feine weiße Wachs-Brech-, mit grünen Schoten | | — | 8 | — | — |
| — | große **weißschalige Wachs- von Algier**, eine ganz neue Bohne, früher als die schwarze römische Wachs-, sehr volltragend und zart | | — | 16 | — | — |
| — | große bunte türkische od. rothbl. Prunk- | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 6½ | — | — |
| — | — weiße — — weißbl. — | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 6½ | — | — |
| — | — zweifarbig blühende Prunk- | | — | 6½ | — | — |

## Gartenbohnen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gartenbohnen, | große englische Windsor- | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| — | — gewöhnliche | à 100 Tl. 5½ Rc. | — | 2 | — | — |
| — | frühe niedrige Mazagon- | | — | 2½ | — | — |
| — | Johnstone's wundervolle englische | | — | 2½ | — | — |

## Grassamen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris, | Rasenstraußgras | à 100 Tl. 19 Rc. | — | 6 | — | — |
| — | stolonifera, Fioringras | à 100 Tl. 19 Rc. | — | 6 | — | — |
| Avena elatior, | französisches Raygras | à 100 Tl. 15 Rc. | — | 5 | — | — |
| — | flavescens, Goldhafer | à 100 Tl. 10 Rc. | — | 3½ | — | — |
| Cynosurus cristatus, | Kammgras | à 100 Tl. Rc. | — | 15 | — | — |
| Dactilis glomerata, | Knaulgras | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 6½ | — | — |
| Holcus lanatus, | Schweizer Honiggras | à 100 Tl. 11 Rc. | — | 4 | — | — |
| Lolium perenne tenue, | englisches Raygras, 1. Qualität, echte perennirende Sorte, direct aus Schottland bezogen | à 100 Tl. 9 Rc. | — | 3 | — | — |
| — | italicum, italienisches Raygras | à 100 Tl. 12 Rc. | — | 4 | — | — |
| Festuca ovina, | Schafschwingel | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 7 | — | — |
| — | duriuscula, harter Schwingel | à 100 Tl. 19 Rc. | — | 6 | — | — |
| Phleum pratense, | Timotheusgras | à 100 Tl. 16 Rc. | — | 5 | — | — |
| Poa pratensis, | glattes Rispengras | à 100 Tl. 33 Rc. | — | 11 | — | — |
| — nemoralis, | feines — | à 100 Tl. 33 Rc. | — | 11 | — | — |
| — trivialis, | rauhes — | à 100 Tl. 33 Rc. | — | 11 | — | — |
| Grassamen, | gemischt zu dauerhaften schönen Rasenplätzen | à 100 Tl. 16 Rc. | — | 5½ | — | — |
| — | — — — — — | sogenannte Thiergarten-Mischung à 100 Tl. 18 Rc. | — | 6 | — | — |
| — | — zu Wiesen | à 100 Tl. 16 Rc. | — | 5½ | — | — |

**Unsere Grasmischungen sind aus den passendsten reinen Sorten zusammengesetzt und haben bisher ungetheilten Beifall gefunden.**

## Obstkerne.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apfelkerne | | — | 18 | 1 | — |
| Birnkerne | | — | 24 | 1 | 6 |
| Erdbeeren, | von den vorzüglichsten Sorten melirt | à Pr. 1½ Sgr. | — | 20 | — |
| Himbeeren, | neue größte gemischt | à Pr. 1 Sgr. | — | 8 | — |
| Stachelbeeren, | englische Riesen-, melirt | à Pr. 1 Sgr. | — | 8 | — |
| Johannisbeeren, | große Groseille cerise | à Pr. 1 Sgr. | — | 5 | — |

## Verschiedenes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Artischocken, | französische grüne | 1 | 20 | 2 | 6 |
| Cardon d'Espagne | oder spanische Cardy | — | 15 | — | 9 |
| Kartoffelsamen, | von guten Sorten gesammelt | 2 | — | 2 | 9 |
| Spargel, | großer Darmstädter | — | 8 | — | 6 |
| — | — Riesen- | — | 15 | — | 9 |

## Tabak. (Nicotiana.)

Unser Tabacks-Sortiment besteht aus ausgezeichnet großblättrigen und feinen Sorten, die allgemeine Verbreitung verdienen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicotiana **capensis,** | sehr einträgliche Sorte vom Cap | 1 | — | 1 | 6 |
| — | longifolia, langblättriger, die alte bekannte Sorte | — | 15 | 1 | — |
| — | rotundifolia, rund- und dickblättriger Amesforter | — | 18 | 1 | — |
| Nicotiana **Salonichi,** | sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig | 1 | — | 1 | 6 |
| Tabak, | **großblättriger brasilianischer** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | von **Cuba** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Havanna** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Maryland** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Portorico** extra schön | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Abago** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Chiras** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Goundi** | 1 | — | 1 | 6 |
| — | — **Ohio** | 1 | — | 1 | 6 |

## Oekonomische Samen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klee, | großer rothblühender Kopf- | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 6½ | — | — |
| — | kleiner weißblühender Stein- | à 100 Tl. 22 Rc. | — | 7 | — | — |
| — | blaublühender oder Luzerne | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 6½ | — | — |
| — | türkischer oder Esparsette | à 100 Tl. 7½ Rc. | — | 2½ | — | — |
| — | Incarnat- oder hochrother, **Trifolium incarnatum** | à 100 Tl. 10 Rc. | — | 3½ | — | — |
| Linsen, | große breite weiße Heller- | | — | 3 | — | — |
| — | — gewöhnliche | à 100 Tl. 7½ Rc. | — | 2½ | — | — |
| Leinsamen, | Halberstädter | à 100 Tl. 6½ Rc. | — | 2½ | — | — |
| — | weißblühender, **Linum americanum album verum** | à 100 Tl. 14 Rc. | — | 5 | — | — |
| Lupinen, | große blaue, zum Gründüngen | à 100 Tl. 4½ Rc. | — | 2 | — | — |
| — | kleine gelbe, — — | à 100 Tl. 4½ Rc. | — | 2 | — | — |
| Mais oder türkischer Weizen, | großer gelber | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| — — — | — brauner | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| — — — | — amerikanischer Pferdezahn- erst im April von neuer Ernte zu haben. | à 100 Tl. 7-8 Rc. | — | 2½ | — | — |
| — — — | Weizen, kleiner früher gelber, **Zea praecox** | à 100 Tl. 8 Rc. | — | 2¾ | — | — |
| Mohn, | blauer mit geschlossenen Köpfen | | — | 4 | — | — |
| — | weißer — — | | — | 6 | — | — |
| — | — Riesen-, **Papaver giganteum** | | — | 6 | — | — |
| — | großer grauer mit offenen Köpfen | | — | 4 | — | — |
| Schwarzkümmel, | **Nigella sativa** | | — | 5 | — | — |
| **Holcus saccharatus,** | Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung sehr empfohlen | | — | 5 | — | — |
| Wicke, | gewöhnliche graue Feld- | à 100 Tl. Rc. | — | — | — | — |
| Felderbse, | neue weiße **Riesen-,** sehr tragbar und zum Trocken- wie zum Grünkochen ganz vorzüglich | à 100 Tl. 5 Rc. | — | 2 | — | — |
| Pferdebohnen | | à 100 Tl. Rc. | — | — | — | — |
| **Gerste,** | beste sechszeilige Winter-, sehr austräglich | à 100 Tl. 4 Rc. | — | — | — | — |
| — | Chevalier-, in kräftigem Boden sehr ergiebig und schwer, der Scheffel 75 Tl. | à 100 Tl. 3 Rc. | — | — | — | — |
| **Weizen,** | weißähriger holländischer mit gelbem Korn. Diese Sorte hat seit mehreren Jahren in hiesiger Gegend nicht vom Befallen gelitten und ist sehr ertragreich | à 100 Tl. 3½ Rc. | — | — | — | — |

## Waldsamen,

aus den reellsten Ausklinge-Anstalten hiesiger Gegend bezogen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acacia, | Robinia Pseudo-Acacia | à 100 Tl. 22 Rc. | — | 8 | — | — |
| Ahorn, | Acer Pseudo-Platanus | à 100 Tl. 8 Rc. | — | 3 | — | — |
| — | spitzer, Acer platanoides | à 100 Tl. 12 Rc. | — | 4 | — | — |
| Berberitzen, | Berberis vulgaris, zu Hecken | à 100 Tl. Rc. | — | 10 | — | — |
| Birke, | Betula alba | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| Buche, | Carpinus Betulus | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| Erle, | Alnus glutinosa | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 7 | — | — |
| — | weiße oder Berg-, Alnus incana | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 7 | — | — |
| Esche, | Fraxinus excelsior | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| Ulme oder Rüster, | Ulmus campestris | à 100 Tl. 20 Rc. | — | 7 | — | — |
| Fichte oder Rothtanne, | Pinus picea | à 100 Tl. 22 Rc. | — | 8 | — | — |
| Kiefer oder Schwarztanne, | Pinus sylvestris | à 100 Tl. 56 Rc. | — | 18 | — | — |
| Lärchen-Tanne, | Pinus larix | à 100 Tl. 45 Rc. | — | 15 | — | — |
| Linde, | Tilia europaea | à 100 Tl. 22 Rc. | — | 8 | — | — |
| Rothbuche, | Fagus sylvatica | à 100 Tl. Rc. | — | — | — | — |
| Weiß- oder Edel-Tanne, | Pinus abies | à 100 Tl. 25 Rc. | — | 8 | — | — |
| Weißdorn, | Crataegus oxycantha, zu Zäunen | à 100 Tl. 7 Rc. | — | 2½ | — | — |
| Maulbeere, weiße, | Morus alba | | — | 18 | — | — |
| — | schwarze, — nigra | | — | 20 | — | — |

## Spargelpflanzen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spargelpflanzen, | echte Riesen-, einjährige | à 100 St. 8 Sgr. | | | | |
| — | — — zweijährige | à 100 St. 15 Sgr. | | | | |
| — | — — dreijährige | à 100 St. — Sgr. | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amaryllis formosissima, | blühbare Zwiebeln | à 100 St. 8 Rc. | | | | |
| Tuberosen, | gefüllte, blühbare | à 100 St. 3 Rc. | | | | |
| Ferraria tigrida (pavonia) | | à 100 St. 2½ Rc. | | | | |
| Ranunkeln | in extra schönem Rummel | à 100 St. 18 Sgr. | | | | |

# Blumensamen.

**Die einen Hauptzweig unserer Gärtnerei bildende Blumensamenzucht wird von uns mit gewissenhaftester Sorgfalt in ausgedehntestem Umfange betrieben, und sind uns Besuche unserer werthen Geschäftsfreunde zur Besichtigung unserer Culturen, wie bisher, auch ferner stets sehr angenehm.**

# Sortimente.

☞ **Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.**

## Levkojen (Mathiola annua),

**allerbeste Quedlinburger, eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertrefflich bewährt haben. Unsere Culturen darin haben wir alljährlich vermehrt, um im Stande zu sein, unsere geehrten Abnehmer mit selbstgewonnener, ganz vorzüglicher Qualität bedienen zu können. Wir cultiviren die beste Qualität in mehr als 50,000 Töpfen auf Stellagen und unter Bedachung.**

### A. Englische Sommer-Levkojen.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hellmordoree | | | | |
| 2 | apfelblüthen | | | | |
| 3 | carmoisinroth | | | | |
| 4 | dunkelviolett | | | | |
| 5 | hellviolett | | | | |
| 6 | zimmtbraun | | | | |
| 7 | fleischfarben | | | | |
| 8 | hellkupferfarben | | | | |
| 9 | dunkelcarminroth | | | | |
| 10 | dunkelschwarzbraun | | | | |
| 11 | weiß | | | | |
| 12 | kupferchamois | | | | |
| 13 | dunkelchamois | | | | |
| 14 | blaßbraun | | | | |
| 15 | dunkelcarmoisinroth | | | | |
| 16 | aschrosa | | | | |
| 17 | dunkelblau | | | | |
| 18 | dunkelziegelroth | | | | |
| 19 | blaßblau mit gelbem Schein | | | | |
| 20 | schwarzbraun | | | | |
| 21 | blaßroth | | | | |
| 22 | kastanienbraun | | | | |
| 23 | carminroth | | | | |
| 24 | dunkelaschgrau | | | | |
| 25 | hellziegelroth | | | | |
| 26 | rothbraun | | | | |
| 27 | lilla | | | | |
| 28 | blaßlilla | | | | |
| 29 | chamois | | | | |
| 30 | pfirsichblüthen | | | | |
| 31 | lasurblau | | | | |
| 32 | rosa mit gelbem Schein | | | | |
| 33 | violett | | | | |
| 34 | leuchtend dunkelcarmoisinroth oder victoriaroth, extra | | | | |
| 35 | neu chamois | | | | |
| 36 | leuchtend kupferroth | | | | |

| № | | | Rc. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen | à Ltk. | 1 | 5 | — |
| 302 | Desgleichen, im Lande gezogener Samen | à Ltk. | — | 13 | — |
| 303 | Dieselben in bester Melange, Topff. à 500 K. Sgr. à 1000 K. Sgr. | à Ltk. | — | 28 | — |
| 304 | Desgleichen Landsamen | à Tl. 9 Rc. à Ltk. | — | 10 | — |
| 305 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 36 Farben | à 100 K. | 1 | 2 | — |
| 306 | — — — — — 32 — | à 100 K. | 1 | — | — |
| 307 | — — — — — 24 — | à 100 K. | — | 22 | — |
| 308 | — — — — — 20 — | à 100 K. | — | 18 | — |
| 309 | — — — — — 16 — | à 100 K. | — | 15 | — |
| 310 | — — — — — 12 — | à 100 K. | — | 11 | — |

### B. Großblumige engl. Sommer-Levkojen (Dippe).

Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigern Wuchs und größere Blumen vor allen übrigen Sorten aus. Die ersten 5 Sorten wurden vor ca. 12 Jahren von uns neu gezogen und in den Handel gebracht.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 42 | dunkelblau | 51 | violett mit Lavendelblatt |
| 43 | rosa | 52 | ziegelroth |
| 44 | carminroth | 53 | chamois |
| 45 | weiß | 54 | hochroth |
| 46 | hellblau | 55 | braunviolett |
| 47 | blaßbraun | 56 | carminrosa |
| 48 | fleischfarben | 57 | kastanienbraun |
| 49 | schwarzbraun | 58 | carmoisin |
| 50 | aschgrau | 59 | aurorafarbig (Dippe) |

| № | | Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| | 60 canariengelb (Dippe) 62 lillarosa | | | |
| | 61 dunkelcarmoisinroth | | | |
| 311 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 10 | 1½ |
| 312 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | 1 | 2 | 1½ |
| 313 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K. ... | — | 20 | — |
| 314 | — — — — — — 16 — à 100 K. ... | — | 16 | — |
| 315 | — — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 12 | — |
| 316 | — — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 8 | — |
| | **C. Engl. Zwerg-Sommer-Levkojen.** | | | |
| | 72 schwarzbraun 75 kupferfarben, großblumig | | | |
| | 73 hellblau 76 dunkelblau | | | |
| | 74 carminroth 77 fleischfarben | | | |
| 317 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 20 | 1½ |
| 318 | Dieselben in bester Mischung .... à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | 1 | 10 | 1½ |
| 319 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **D. Engl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.** | | | |
| | 83 schwarzbraun 92 weiße Kugel- | | | |
| | 84 pfirsichblüthen 93 aschgrau | | | |
| | 85 dunkelcarmoisinroth 94 blaßlilla | | | |
| | 86 blaßziegelroth 95 rothbraun | | | |
| | 87 dunkelblau 97 violett | | | |
| | 88 hellblau 98 dunkellilla | | | |
| | 89 fleischfarben 99 blaßbraun | | | |
| | 90 mohngrau 100 carminroth | | | |
| | 91 dunkelviolett 101 schwefelgelb | | | |
| 320 | Jede Sorte separat, Topfsamen ... à Lth. | 1 | 5 | 1½ |
| 321 | Desgleichen Landsamen ... à Lth. | — | 13 | — |
| 322 | Dieselben in bester Melange, Topf. à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | — | 28 | 1½ |
| 323 | Desgleichen Landsamen ... à tl. Rt. à Lth. | — | 10 | — |
| 324 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K. ... | — | 16 | — |
| 325 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 11 | — |
| 326 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 7 | — |
| | **E. Engl. Bastard-Sommer-Levkojen,** zwischen Salbei- und Lackblatt. | | | |
| | 108 carminroth 112 canariengelb, extra (Dippe) | | | |
| | 109 lilla 113 weiß, im Verblühen lasurblau | | | |
| | 110 rosa 114 lasurblau mit gelbem Auge | | | |
| | 111 weiß mit rosa Schein | | | |
| 327 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 10 | 1½ |
| 328 | Dieselben in Melange ... à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | 1 | 2 | 1½ |
| 329 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **F. Immerblühende Sommer-Levkojen.** | | | |
| | Diese verzweigen sich mehr und blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst. | | | |
| | 121 weiß 125 fleischfarben | | | |
| | 122 rothgrau 126 dunkelblau | | | |
| | 123 rothbraun 127 carmoisin | | | |
| | 124 ziegelroth 128 dunkelviolett | | | |
| 330 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 8 | 1½ |
| 331 | Dieselben in bester Melange .... à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | 1 | — | 1½ |
| 332 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ... | — | 8 | — |
| 333 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 4 | — |
| | **G. Halbenglische Sommer-Levkojen.** | | | |
| | 134 dunkelcarmoisinroth 140 kupferroth | | | |
| | 135 blaßziegelroth 141 apfelblüthen | | | |
| | 136 leberfarben 142 dunkelchamois | | | |
| | 137 dunkelschwarzbraun 143 dunkelblau | | | |
| | 138 dunkelziegelroth 144 weiß | | | |
| | 139 mohngrau 145 carmoisinroth | | | |
| 334 | Jede Sorte separat, Topfsamen ... à Lth. | 1 | 5 | 1½ |
| 335 | Desgleichen Landsamen ... à Lth. | — | 13 | — |
| 336 | Dieselben in bester Melange, Topf. à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | — | 28 | 1½ |
| 337 | Desgleichen Landsamen ... à tl. Rt. à Lth. | — | 10 | — |
| 338 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ... | — | 11 | — |
| 339 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 8 | — |
| | **H. Neue großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levkojen.** | | | |
| | 146 dunkelblau 154 rothbraun | | | |
| | 147 carminroth 155 lachsrosa | | | |
| | 148 röthlichlilla 156 chamois | | | |
| | 149 dunkelrosa 157 canariengelb (Lackblatt) | | | |
| | 150 hellblau 158 brillant lilla (Bastardblatt) | | | |
| | 151 weiß (Lackblatt) 159 weiß mit rosa Anhauch | | | |
| | 153 schwarzbraun 160 rein weiß | | | |
| 340 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 10 | 1½ |
| 341 | Dieselben in bester Melange .... à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. à Lth. | 1 | 2 | 1½ |
| 342a | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 14 Farben à 100 K. ... | — | 14 | — |
| 342b | — — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 12 | — |
| 342c | — — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 8 | — |
| 343 | — — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **I. Neue großblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.** | | | |
| | 161 brillant rosenroth 165 apfelblüthen | | | |
| | 162 dunkelblau 166 rothbraun | | | |
| | 163 hellblau 167 lachsrosa | | | |
| | 164 carmoisin 168 aschgrau | | | |
| 344 | Jede Sorte separat ... | 2 | — | 2 |
| 345 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 5 Sgr. à 1000 K. 10 Sgr. à Lth. | 1 | 20 | 1½ |
| 346a | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 346b | — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 7½ | — |
| 347 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

Vorstehende beiden Gattungen Pyramiden-Levkojen haben wir durch sorgfältige Cultur zu solcher Vollkommenheit gebracht, daß wir dieselben jetzt mit Recht empfehlen können.

**K. Neue Bouquet-Sommer-Levkojen.**

Dieselben zeichnen sich durch stärkere Verzweigung und längere Blüthezeit aus.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 175 carmoisinroth 177 dunkelviolett | | | |
| | 176 rosenroth 178 hellblau | | | |
| 348 | Jede Sorte separat ... | 1 | 15 | 1½ |
| 349 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 4 Sgr. à 1000 K. 8 Sgr. à Lth. | 1 | 6 | 1½ |
| 350a | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 8 | — |
| 350b | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |
| | **L. Engl. Herbst- oder Bastard-Levkojen.** | | | |
| | 201 dunkelblau 207 blaßroth | | | |
| | 202 carmoisinroth 208 hellblau | | | |
| | 203 carminroth 209 rosenroth | | | |
| | 204 hellmordoree 210 fleischfarben | | | |
| | 205 ziegelroth 211 weiß mit Lackblatt | | | |
| | 206 blaßbraun 212 kastanienbraun | | | |
| 351 | Jede Sorte separat ... à 1000 K. 15 Sgr. à Lth. | 2 | 20 | 2½ |
| 352 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. à Lth. | 2 | 10 | 2 |
| 353 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ... | — | 15 | — |
| 354 | — — — — — — 10 — à 100 K. ... | — | 12 | — |
| 355 | — — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 7½ | — |
| | **M. Frühblühende engl. Herbst-Levkojen.** | | | |
| | 213 dunkelblau 216 blaßblau | | | |
| | 214 carminroth 217 braunviolett mit Lackblatt | | | |
| | 215 weiß 218 carminroth — — | | | |
| 356 | Jede Sorte separat ... à 1000 K. 15 Sgr. à Lth. | 2 | 20 | 2½ |
| 357 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. à Lth. | 2 | 10 | 2 |
| 358 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 8 | — |
| 359 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

Die frühblühenden Herbst-Levkojen sind sehr zu empfehlen, indem sich dieselben auch vorzüglich zur Cultur im freien Lande eignen. Mitte März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt, entwickeln sie ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört, reichlich.

| № | | Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| | **N. Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.** | | | |
| | 223 violett 230 brillant rosakupfer | | | |
| | 224 carminroth 231 dunkelcarmin | | | |
| | 225 rosenroth 232 kupferroth | | | |
| | 226 hellblau 233 feuerroth mit Lackblatt (Dippe) | | | |
| | 227 fleischfarben à Lth. 80 Sgr. | | | |
| | 228 hellpurpur 234 hellcarmoisinroth | | | |
| | 229 schwefelgelb mit Lackblatt à 1000 K. 20 Sgr. | | | |
| 360 | Jede Sorte separat ... à 1000 K. 18 Sgr. à Lth. | — | — | 2½ |
| 361 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. à Lth. | 2 | 10 | 2 |
| 362 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ... | — | 15 | — |
| 363 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 364 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |
| | **O. Großblumige Kaiser-Levkojen (Dippe).** | | | |
| | 238 carmoisin ... à Lth. 70 Sgr. 242 hellblau | | | |
| | 239 rein weiß ... à Lth. 80 Sgr. 243 blaßroth | | | |
| | 240 braunviolett ... à Lth. 80 Sgr. 244 rosa, kugelblüthig | | | |
| | 241 pfirsichblüthen 245 carminrosa, extra | | | |
| 365 | Jede Sorte separat ... à 1000 K. 18 Sgr. à Lth. | — | — | 2½ |
| 366 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 8 Sgr. à 1000 K. 15 Sgr. à Lth. | 2 | 10 | 2 |
| 367 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 368 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

Vorstehende von uns neu gezogenen großblumigen Kaiser-Levkojen übertreffen die ältern Sorten durch größere Blumen und schönern Bau, blühen auch zeitiger als letztere, und sind daher zum Herbstflore im freien Lande zu verwenden, wenn sie Mitte März ausgesäet werden. Will man Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahre blühend haben, so säe man solche Mitte Juni aus und pflanze in Töpfe von 5" Weite 4 Pflanzen.

**P. Quedlinburger Winter-Levkojen (Mathiola incana),**

unübertreffliche Sorten, die große Stöcke bilden, und sehr gut gefüllt fallen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 251 weiß mit dunklem Korn 259 kupferbraun | | | |
| | 252 dunkelblau 260 rosenroth | | | |
| | 253 carminroth, baumartig, niedrig 261 hochroth | | | |
| | 254 carminroth 262 fleischfarben | | | |
| | 255 feuerroth 263 carminroth mit Lackblatt | | | |
| | 256 dunkelschwarzbraun 264 weiß — | | | |
| | 257 hellblau 265 dunkelblau — | | | |
| | 258 hellziegelroth 266 schwefelgelb — | | | |
| 369 | Jede Sorte separat ... à 1000 K. 15 Sgr. à Lth. | — | — | 2 |
| 370 | Dieselben in bester Melange ..... à 500 K. 4 Sgr. à 1000 K. 8 Sgr. à Lth. | 1 | 12 | 1½ |
| 371 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 15 Farben à 100 K. ... | — | 20 | — |
| 372 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 15 | — |
| 373 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 374 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 5 | — |
| | **Q. Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkojen,** extra in's Gefüllte fallende Sorten. | | | |
| | 271 königsblau ... à Lth. 50 Sgr. 275 dunkelblaue Zwerg-, ganz neu | | | |
| | 272 carminroth ... à Lth. 50 Sgr. à Lth. 50 Sgr. | | | |
| | 273 weiß ... à Lth. 50 Sgr. 276 rosenrothe Zwerg- | | | |
| | 274 hochrothe Zwerg- à Lth. 50 Sgr. à 1000 K. 30 Sgr. | | | |
| 375 | Vorstehende Sorten, jede separat ... à 1000 K. 15 Sgr. | — | — | 2 |
| 376 | Dieselben in bester Melange .... à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. à Lth. | 1 | 10 | 1½ |
| 377 | Ein Sortiment obiger 6 Sorten à 100 K. ... | — | 9 | — |
| 378 | — — Cocardeau-Winter-Levkojen in 3 Sorten à 100 K. ... | — | 4 | — |
| 379 | — — Zwerg- — — — 3 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

## Astern (Aster chinensis).

**Durch eigene sorgfältige Culturen haben wir unsere Astern von Jahr zu Jahr zu immer größerer Vollkommenheit gebracht, und unser Streben nach dieser Richtung hin, in dem wir auch ferner nicht ermüden werden, ist denn auch nicht ohne Erfolg geblieben, indem unsere Astern nicht nur allenthalben die verdiente Anerkennung gefunden, sondern die Aufträge auf zu liefernden Samen sich stets dergestalt gemehrt haben, daß wir, um den gestellten Anforderungen genügen zu können, die Culturen darin alljährlich zu vermehren uns genöthigt sehen. So hat denn auch unser, in diesem Jahre einen Flächenraum von über 16 Morgen bedeckende Astern-Flor wieder allgemeine Bewunderung erregt.**

**A. Feder- oder Röhr-Aster, extra gefüllt.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 carmoisinroth 10 blaßroth mit weiß | | | |
| | 2 dunkelcarmoisinroth 11 violett | | | |
| | 3 rein weiß 12 pfirsichblüthen | | | |
| | 4 weiß mit rothem Herz 13 rosenroth | | | |
| | 5 dunkelcarmoisinroth mit weiß 14 blaßrosa | | | |
| | 6 gelblich weiß 15 himmelblau mit weiß | | | |
| | 7 aschgrau 16 violett mit weiß | | | |
| | 8 lilla 17 blutbraun | | | |
| | 9 dunkelblau 18 silberweiß | | | |
| 384 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 6 | 1 |
| 385 | Dieselben in bester Mischung ... à tl. 3½ Rt. à Lth. à 500 K. 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | — | 4 | 1 |
| 386 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 387 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 7 | — |
| 388 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

**B. Kugel-Aster, extra gefüllt.**

Die Blumen sind größer und schöner geformt als die der Röhr-Aster.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 21 aschgrau 30 hellcarmin | | | |
| | 22 fleischfarben 31 dunkellilla | | | |
| | 23 dunkelrosa mit weiß 32 rosa mit weiß | | | |
| | 24 carmoisinroth mit weiß 33 dunkelblau mit weiß | | | |
| | 25 dunkelcarmoisinroth 34 violettbraun | | | |
| | 26 weiß 35 carmoisin | | | |
| | 27 apfelblüthen 36 dunkelviolett | | | |
| | 28 blaßroth 37 violettbraun mit weiß | | | |
| | 29 dunkelblau 38 violett | | | |
| 389 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 6 | 1 |
| 390 | Dieselben in bester Melange ... à tl. 3½ Rt. à Lth. à 500 K 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | — | 4 | 1 |
| 391 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 392 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 7 | — |
| 393 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

**C. Zwerg-Aster, extra gefüllt und sehr echt, 6—8 Zoll hoch.**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 52 weiß mit carmin 60 dunkelrosa | | | |
| | 53 dunkelroth mit weiß 61 violett mit weiß | | | |
| | 54 blaßroth 62 dunkelroth | | | |
| | 55 dunkellilla 63 pfirsichblüthen | | | |
| | 56 blaßlilla 64 carmoisin mit weiß | | | |
| | 57 hellblau 65 blaßroth mit weiß | | | |
| | 58 hellcarmin 66 rein weiß | | | |
| | 59 kupferbraun 67 dunkelblau | | | |
| 394 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 10 | 1 |
| 395 | Dieselben in bester Melange ... à tl. 7 Rt. à Lth. à 500 K. 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | — | 8 | 1 |
| 396 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 397 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 7½ | — |
| 398 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 5 | — |

| № | | Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| | **D. Türkische Aster (halbhohe Kugel-).** | | | |
| | 71 dunkelrosa — 76 weiß, kleinblumig | | | |
| | 72 dunkelcarminroth — 77 carminroth mit weiß | | | |
| | 73 weiß mit rosa — 78 violett | | | |
| | 74 violett mit weiß — 79 lillarosa | | | |
| | 75 dunkelcarmoisinroth — 80 lilla mit weiß | | | |
| 399 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 6 | 1 |
| 400 | Dieselben in bester Melange ... à tl. 3½ Rt. à Lth. | — | 4 | 1 |
| | à 500 K. 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | | | |
| 401 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K. ... | — | 7 | — |
| 402 | — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 4½ | — |
| | **E. Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt.** | | | |
| | 82 dunkelblau — 92 rothbraun | | | |
| | 83 dunkelrosa mit weiß umflort — 93 carmoisin | | | |
| | 84 dunkelcarmoisin — 94 dunkellilla mit weiß | | | |
| | 85 pfirsichblüthen — 95 kupferrosa | | | |
| | 86 hellcarminroth — 96 braunviolett | | | |
| | 87 blaßschwefelgelb — 97 brennend carmoisin mit weiß | | | |
| | 88 weiß — 98 röthlichlilla | | | |
| | 89 kupferlilla — 99 braunlilla | | | |
| | 90 dunkelroth mit weiß — 100 hellazurblau | | | |
| | 91 apfelblüthen — 101 leuchtend lachsroth | | | |
| 403 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 12 | 1 |
| 404 | Dieselben in bester Melange ... à tl. 8 Rt. à Lth. | — | 9 | 1 |
| | à 500 K. 2½ Sgr. à 1000 K. 5 Sgr. | | | |
| 405 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K. ... | — | 12½ | — |
| 406 | — — — — — 16 — à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 407 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 8 | — |
| 408 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **F. Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.** (Dippe.) | | | |
| | Diese von uns gezogenen und zuerst in Handel gebrachten Astern eignen sich auch für Topf-Cultur und sind sehr zu empfehlen. Die Stöcke bauen sich in einer Höhe von 1 bis 1½ Fuß in der Form eines pyramidenartigen Bouquets. Auf einem freien Standorte bilden dieselben starke Mittelstengel und tragen sich die Blumen von selbst, so daß ein Anbinden der Stöcke überflüssig ist. Obgleich diese Sorte immer noch in Pyramiden- und ganz niedrige Zwerg-Astern sehr stark variirt, was sich trotz der von uns angewandten sorgfältigen Cultur immer noch nicht verliert, verdient und findet dieselbe allgemeine Anerkennung, indem die meisten Pflanzen bei guter Cultur circa 150 bis 200 gefüllte Blumen liefern. | | | |
| | 111 dunkelcarmoisin mit gelbem Schein — 119 weiß mit rosa | | | |
| | 112 rosenroth — 120 lazurblau mit weiß | | | |
| | 113 carmoisin — 121 fleischfarben | | | |
| | 114 lebhaft rosa — 122 rein weiß | | | |
| | 115 pfirsichblüthen — 123 violett | | | |
| | 116 carmin mit weiß — 124 lillarosa | | | |
| | 117 dunkelblau — 125 hellblau | | | |
| | 118 lillaroth, frühblühend — 126 milchweiß | | | |
| 409 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 25 | 1½ |
| 410 | Dieselben in bester Mel. à 500 K. 4 Sgr. à 1000 K. 8 Sgr. à tl. 16 Rt. à Lth. | — | 18 | 1½ |
| 411 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ... | — | 14 | — |
| 412 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 413 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 7 | — |
| | **G. Französische päonienblüthige (Truffaut's Perfection-) Pyramiden-Aster, ganz ausgezeichnet, von der größten Vollkommenheit.** | | | |
| | 131 hellblau mit weiß — 144 dunkelcarmoisin | | | |
| | 132 weiß, rund gebaut — 145 fleischfarben, niedrig | | | |
| | 133 rein weiß, lockig gebaut — 146 violettroth | | | |
| | 134 schwarzblau mit Atlasglanz — 147 weiß mit dunkellilla | | | |
| | 135 schwarzblau mit weiß — 148 rothbraun mit weiß | | | |
| | 136 weiß mit schwarzblau — 149 la superbe, prächtig rosenroth, extra großblumig | | | |
| | 137 lebhaft rosa | | | |
| | 138 rosa mit weiß — 150 weiß mit lillarosa | | | |
| | 139 dunkelrosenroth mit weiß — 151 violettroth mit weiß | | | |
| | 140 carmoisin — 152 apfelblüthen | | | |
| | 141 dunkelcarmin mit weiß — 153 feurig carmoisin | | | |
| | 142 weiß mit dunkelcarminrothem Herz — 154 purpurviolett mit weiß | | | |
| | 143 weiß mit rosa — 155 victoriaroth (leuchtend feuerroth) mit weiß | | | |
| 414 | 12 Sorten, jede separat ... à Lth. | 1 | 15 | 2 |
| 415 | Dieselben in bester Melange, I. Qual. ... à tl. 28 Rt. à Lth. | — | 30 | 1½ |
| | à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. | | | |
| 416 | Dieselben in guter Mischung, II. Qual. ... à tl. 18 Rt. à Lth. | — | 20 | — |
| 417 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 24 Farben à 100 K. ... | 1 | — | — |
| 418 | — — — — — 20 — à 100 K. ... | — | 25 | — |
| 419 | — — — — — 18 — à 100 K. ... | — | 22½ | — |
| 420 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 15 | — |
| 421 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 10 | — |
| | **H. Ranunkelblüthige Aster.** | | | |
| | Dieselben machen auf Gruppen oder in Beeten keinen Effect; doch sind die Blumen niedlich, und, ihrer Haltbarkeit wegen, zu Bouquets und Kränzen geeignet. | | | |
| | 162 rosa — 166 hellblau | | | |
| | 163 carmoisin — 167 weiß | | | |
| | 164 rosa mit weiß — 168 hellblau mit weiß | | | |
| | 165 carmin mit weiß — 169 dunkelblau | | | |
| 422 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 10 | 1 |
| 423 | Dieselben in bester Melange ... à tl. 6 Rt. à Lth. | — | 7 | 1 |
| | à 500 K. 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | | | |
| 424 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ... | — | 6 | — |
| 425 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 3 | — |
| | **I. Truffaut's imbriqué Pompon-Aster, äußerst zierlich und reichblühend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.** | | | |
| | 171 carmin mit weiß — 176 weiß mit dunkelblau | | | |
| | 172 rein weiß — 177 rosa | | | |
| | 173 violett mit weiß — 178 carmin | | | |
| | 174 dunkelrosenroth mit weiß — 179 braunviolett mit weiß | | | |
| | 175 hellblau mit weiß — 180 weiß mit carmin | | | |
| 426 | 6 Sorten, jede separat ... à Lth. | — | 32 | 1½ |
| 427 | Dieselben in bester Mischung ... à tl. 22 Rt. à Lth. | — | 24 | 1½ |
| | à 500 K. 4 Sgr. à 1000 K. 8 Sgr. | | | |
| 428 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 429 | — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **K. Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster,** sehr brillant (sind bedeutend verbessert). | | | |
| 187 | carmoisin mit weißem Herz } bedürfen noch der Verbesserung | | à Lth. | — 12 1 |
| 188 | hellblau — — — } | | à Lth. | — 12 1 |
| 189 | dunkelblau — — — extra ... | | à Lth. | — 25 1 |
| 190 | dunkelroth — — — — ... | | à Lth. | — 25 1 |
| 191 | rosa — — — — ... | | à Lth. | — 25 1 |
| 430 | Dieselben in bester Mischung, I. Qual. ... à tl. 16 Rt. à Lth. | — | 18 | 1 |
| | à 500 K. 3 Sgr. à 1000 K. 6 Sgr. | | | |
| 431 | Dieselben in guter Mischung ... à tl. 11 Rt. à Lth. | — | 12 | — |
| 432 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 K. ... | — | 5 | — |
| 433 | — — der besten 3 Farben à 100 K. ... | — | 3 | — |
| | **L. Igel- oder Nadel-Aster.** | | | |
| | Diese bedürfen hinsichtlich der Gefülltheit noch der Verbesserung, doch sollen sich dieselben sehr gut zum Trocknen für Winter-Bouquets eignen. | | | |
| | 201 rosenroth, Kugelbau — 204 dunkelblau, Pyramidenbau | | | |
| | 202 dunkelroth, Pyramidenbau — 205 carminrosa, — extra | | | |
| | 203 hellblau, — — 206 dunkelcarmoisin, Kugelbau | | | |

| № | | Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 434 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | 10 | 1 |
| 435 | Dieselben in bester Mischung ... à tl. 6 Rt. à Lth. | — | 7 | 1 |
| | à 500 K. 2 Sgr. à 1000 K. 4 Sgr. | | | |
| 436 | Ein Sortiment vorstehender 6 Farben à 100 K. ... | — | 5 | — |
| | **M. Chrysanthemumblüthige niedrige großblumige Aster,** ganz besonders empfehlenswerth. | | | |
| | 215 rosa — 225 weiß mit hellblau | | | |
| | 216 hellblau — 226 rein weiß (Dippe) | | | |
| | 217 dunkelblau — 227 rein weiß, im Verblühen lasurblau | | | |
| | 218 carmin (Benary) | | | |
| | 219 weiß mit rosa — 228 weiß mit dunkelblau | | | |
| | 220 dunkelblau mit weiß — 229 fleischfarben | | | |
| | 221 hellblau mit weiß — 230 lachsrosa, neu | | | |
| | 222 carmin mit weiß — 231 brillantrosa, ganz neu, ausgezeichnetste | | | |
| | 223 dunkelrosa mit weiß Sorte ... à 1000 K. Sgr. | | | |
| | 224 dunkelcarmin | | | |
| 437 | 8 Sorten, jede separat ... à Lth. | 1 | 20 | 2½ |
| 438 | Beste Mischung à 500 K. 7½ Sgr. à 1000 K. 15 Sgr. à tl. Rt. à Lth. | 1 | 10 | 2 |
| 439 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ... | — | 24 | — |
| 440 | — — — — — 12 — à 100 K. ... | — | 18 | — |
| 441 | — — — — — 8 — à 100 K. ... | — | 12 | — |
| | **N. Riesen-Kaiser-Aster.** (Gotth. & Co.) | | | |
| | Riesen-Kaiser-Aster liefern trotz aller angewendeten sorgfältigen Culturen immer noch sehr schlechte Resultate, wodurch wir uns veranlaßt sehen, dieselben gänzlich auszurangiren, und hoffen wir damit im Sinne unserer geehrten Geschäftsfreunde zu handeln. Wir haben dieselben in diesem Jahre nochmals gebaut und geben auf gef. Verlangen zu Cultur-Versuchen Sortimente davon gratis ab. An Stelle der Riesen-Kaiser-Aster empfehlen wir die verbesserten Rosen-, besonders aber Victoria-Astern. | | | |
| | **O. Neue Uhlands-Aster** (päonienblüthige Kugel-). (Dippe.) | | | |
| | Auf Wunsch mehrerer unserer Erfurter Geschäftsfreunde haben wir obige von uns gezogene und eingeführte päonienblüthige Kugel-Aster **„Uhlands-Aster"** genannt. | | | |
| | Die Blumen dieser sehr empfehlenswerthen Gattung sind in Form den Päonien-Astern gleich, erreichen vielfach die Größe der Riesen-Kaiser-Aster, und verzweigen sich dabei gerade so stark und in derselben Weise, wie Kugel- oder Röhr-Astern, so daß man eines Anbindens der Pflanzen hierbei gänzlich überhoben ist. — **Diese Gattung ist daher für Gruppen unschätzbar.** | | | |
| 251 | schneeweiß ... à Lth. | — | 22 | 1½ |
| 252 | lebhaft rosa mit weiß umflort ... à Lth. | — | 22 | 1½ |
| 253 | carmoisin ... à 1000 K. 18 Sgr. | — | 60 | 2½ |
| 254 | rosa mit weiß, 1864er Neuheit ... à 1000 K. 18 Sgr. | — | 60 | 2½ |
| 255 | dunkelcarmoisin mit weiß, 1864er Neuheit ... à 1000 K. 18 Sgr. | — | 60 | 2½ |
| 256 | hellblau, 1865er Neuheit ... à 1000 K. 18 Sgr. | — | 60 | 2½ |
| 257 | carmin mit weiß, 1865er Neuheit ... à 1000 K. 18 Sgr. | — | 60 | 2½ |
| 448 | Dieselben in bester Mischung, I. Qual. ... à Lth. | 1 | 10 | 2 |
| | à 500 K. 7½ Sgr. à 1000 K. 15 Sgr. | | | |
| 449 | Dieselben in guter Mischung ... à tl. 23 Rt. à Lth. | — | 25 | — |
| 450 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 12 | — |
| 451 | — — — — — 3 — à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **P. Neue Zwerg-Bouquet-Aster.** (Boltze.) | | | |
| | Diese „Zwerg-Bouquet-Aster", welche circa 8" hoch wird, hat die gute Eigenschaft, im Habitus ganz constant zu sein, weshalb sie die immer noch variirenden Zwerg-Astern verdrängen wird. | | | |
| | **Obgleich vor 4 Jahren diese „Zwerg-Bouquet-Aster" vom Züchter unter diesem Namen eingeführt wurde und im „deutschen Garten-Magazin" abgebildet war, haben dennoch einige Samenhandlungen dieselbe in ihren Verzeichnissen der Saison $18\frac{62}{63}$ u. $18\frac{63}{64}$ als Victoria-Aster aufgenommen.** | | | |
| | **Es ist also hiermit „die von uns gezogene Victoria-Aster" nicht zu verwechseln.** | | | |
| | 271 weiß mit rothem Herz — 274 dunkelviolett mit weiß | | | |
| | 272 dunkelcarmin mit weiß — 275 weiß mit dunkelblau | | | |
| | 273 carmin mit weiß — 276 carmin | | | |
| | 277 rosa mit weiß | | | |
| 453 | Jede Sorte separat ... à Lth. | — | — | 1½ |
| 454 | Beste Mischung ..... à 500 K. 4 Sgr. à 1000 K. 8 Sgr. à tl. 18 Rt. à Lth. | — | 20 | 1½ |
| 455 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | — | 6 | — |
| 456 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 4 | — |
| | **Q. Neue Zwerg-Pyramiden-Aster.** (Dippe.) | | | |
| | Die neue Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1' hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die alle dichtgefüllt sind und so, in ihrer aufrechten Stellung, einen herrlichen Flor für Gruppen wie zu Einfassungen bilden. Da diese Sorte gar nicht variirt, wird sie, sobald erst noch mehrere Farben von gleicher Eigenschaft gezogen sind, die Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster verdrängen. | | | |
| 281 | lasurblau ... à Lth. | — | 20 | 1½ |
| 282 | lasurblau mit weiß ... à Lth. | — | 20 | 1½ |
| 283 | dunkelblau ... à Lth. | 1 | — | 1½ |
| 284 | rosa ... à Lth. | 1 | — | 1½ |
| 285a | weiß mit lasurblau ... à Lth. | 1 | — | 1½ |
| 458 | Dieselben egal gemischt à 500 K. 5 Sgr. à 1000 K. 10 Sgr. à tl. Rt. à Lth. | — | 25 | 1½ |
| 459 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 5 Farben à 100 K. ... | — | 6 | — |
| | **R. Zwerg-Turban-Aster, neu.** Die Blätter sind von schwarzbräunlicher Färbung. | | | |
| 461 | dunkelroth mit weiß ... à Lth. | — | — | 2 |
| | **S. Neue großblumige niedrige Päonien-Aster, (verbesserte Rosen-).** (Dippe.) | | | |
| | Diese prachtvolle neue Gattung ist niedriger als die Päonien- (Truffaut's) Aster mit sehr großen dichtgefüllten Blumen, dieselben sind geformt wie Päonien- und Päonien-Perfection-Aster. Der Habitus der Pflanzen ist sehr schön pyramidenförmig. | | | |
| | 285b lebhaftrosa mit weiß umflort — 289 rein weiß | | | |
| | 286 hellblau — 290 dunkelblau, neu | | | |
| | 287 weiß, nach innen rosa Schein — 291 dunkelcarmoisin mit weiß | | | |
| | 288 weiß mit dunkellilla — 292 dunkelcarmin | | | |
| 462 | Jede Sorte separat ... à Lth. | 1 | 15 | 2 |
| 463 | Beste Mischung à 500 K. 6 Sgr. à 1000 K. 12 Sgr. à tl. 28 Rt. à Lth. | — | 30 | 2½ |
| 464a | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ... | — | 10 | — |
| 464b | — — — — — 6 — à 100 K. ... | — | 7½ | — |
| | **T. Neueste Victoria-Aster.** (Dippe.) | | | |
| | **Diese Aster, die schönste, welche bis jetzt existirt und deren erste Varietät wir vor 3 Jahren einführten, haben wir das Glück gehabt zu ziehen. Es ist uns ein erneutes Vergnügen, die folgenden prachtvollen Farben, welche wir seitdem erzielten, dem Handel übergeben zu können. Die Blumen dieser Gattung sind stark gefüllt imbriquirt, hochgewölbt, kugelblüthig und so groß als die der Riesen-Kaiser-Aster, dabei tragen sie sich so schön, daß es nur eines Anbindens des Mittelstieles bedarf. Der Habitus der Pflanzen, deren jede 10—20 Blumen liefert, ist ein sehr schöner pyramidenförmiger von 1¾ Fuß Höhe. Die Pflanzen müssen, wenn man davon ein gutes Resultat erzielen will, 1½ Fuß in Quadrat gepflanzt werden.** | | | |
| 301 | **carminrosa** } 1864er Neuheit ... à 1000 K. 40 Sgr. | — | — | 5 |
| 302 | **dunkelblau mit weiß** ... à 1000 K. 60 Sgr. | — | — | 7 |
| 303 | **carmoisin** ... à 1000 K. 40 Sgr. | — | — | 5 |
| 304 | **hellblau mit weiß** ... à 1000 K. 60 Sgr. | — | — | 7 |
| 305 | **weiß** ... à 1000 K. 30 Sgr. | — | — | 4 |
| 306 | **lillarosa** ... à 1000 K. 40 Sgr. | — | — | 5 |
| 466 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ... | 1 | — | — |
| 467 | — — — — — 4 — à 100 K. ... | — | 20 | — |

| № | | | Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|

## Goldlack. (Cheiranthus cheiri.)

**Die Qualität der nachstehenden Lacksorten ist unübertrefflich.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Goldlack, **extra gefüllter** | dunkelbrauner Stangen- | à Lth. | 1 | 15 2 |
| 471 | — — — | brauner — | à Lth. | 1 | 15 2 |
| 472 | — — — | gelber — | à Lth. | 2 | — 2½ |
| 473 | — — — | canariengelber — à 1000 K. 24 Sgr. | à Lth. | 3 | — 3 |
| 474 | — — — | blauer (violetter) — à 1000 K. 24 Sgr. | à Lth. | 3 | — 3 |
| 475 | — — — | dunkelbrauner Zwerg-Stangen- à 1000 K. 20 Sgr. | à Lth. | 2 | — 2½ |
| 476 | — — — | blauer Zwerg-Stangen- à 1000 K. 25 Sgr. | à Lth. | 3 | 10 4 |
| 477 | — gefüllter | brauner und dunkelbrauner | à Lth. | — | 20 1½ |
| 478 | — — — | Zwerg-Busch- à 1000 K. 20 Sgr. | à Lth. | 2 | — 2½ |
| 479 | — — | blauer — — à 1000 K. 24 Sgr. | à Lth. | 2 | 20 3 |
| 480 | — — | bronzefarbiger Zwerg-Busch- à 1000 K. 24 Sgr. | à Lth. | 2 | 20 3 |
| 481 | — | einfach rein dunkelbrauner großblum. Busch- à Tl. 7 Rt. | à Lth. | — | 8 1 |
| 482 | — — — — | — Zwerg-Busch- à Tl. 8 Rt. | à Lth. | — | 9 1 |
| 483 | — | gewöhnlich brauner Busch- à Tl. 2 Rt. | à Lth. | — | 3 ½ |
| 484 | Beste Mischung von extra gefülltem Stangenlack à 500 K. 8 Sgr. à 1000 K. 16 Sgr. | | à Lth. | 1 | 15 2 |
| 485 | Gefüllter Buschlack in bester Melange à 500 K. 9 Sgr. à 1000 K. 18 Sgr. | | à Lth. | 1 | 25 2½ |
| 486 | Ein Sortiment vorstehender bestgefüllter 10 Sorten à 100 K. | | | — | 18 — |
| 487 | — — — — 6 — à 100 K. | | | — | 9 — |

## Balsaminen.

### A. Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | weiß | 9 | weiß mit violett |
| 2 | scharlach | 10 | purpur |
| 3 | hellziegelrosa | 11 | pfirsichblüthen |
| 4 | lilla | 12 | lillarosa |
| 5 | granatroth | 13 | hautfarben |
| 6 | dreifarbig (weiß, lilla und roth) gestreift | 14 | hochrosa |
| | | 15 | helllilla |
| 7 | blaßlilla mit carmoisin und violett punktirt und gestreift | 16 | carmoisin |
| | | 17 | dunkelviolett |
| 8 | blaßrosa | 18 | weiß mit kupferfarben |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 488 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 18 1½ |
| 489 | Beste Mischung ... à 200 K. 3 Sgr. à 500 K. 7 Sgr. | à Tl. 11 Rt. | à Lth. | — | 12 1 |
| 490 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 50 K. | | | — | 18 — |
| 491 | — — — — — 12 — | à 50 K. | | — | 12 — |
| 492 | — — — — — 8 — | à 50 K. | | — | 8 — |

### B. Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-Balsaminen genannt).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | dunkelblau | 27 | lilla |
| 22 | rein weiß | 28 | weiß mit rosa Schein |
| 23 | rosenfarbig | 29 | blaßgelb |
| 24 | granatroth | 30 | brillant ziegelroth |
| 25 | apfelblüthen | 31 | chamois, neu |
| 26 | purpurroth | 32 | chamoisrosa, neu |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 493 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 30 1½ |
| 494 | Beste Mischung à 200 K. 5 Sgr. | à 500 K. 12 Sgr. à Tl. 22 Rt. | à Lth. | — | 24 1½ |
| 495 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. | | | — | 15 — |
| 496 | — — — — — 8 — | à 50 K. | | — | 10 — |

### C. Punktirte Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (Andrieux's verbesserte Camellien-).

| | | | |
|---|---|---|---|
| 33 | scharlach mit weiß | 36 | rosa mit weiß |
| 34 | violett mit weiß | 37 | carminrosa mit weiß |
| 35 | carmoisin mit weiß | 38 | lilla mit weiß |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 497 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 30 1½ |
| 498 | Beste Mischung à 200 K. 5 Sgr. | à 500 K. 12 Sgr. à Tl. 22 Rt. | à Lth. | — | 24 1½ |
| 499 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 50 K. | | | — | 7½ — |

### D. Gefüllte Camellien-Balsaminen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 40 | weiß mit scharlach | 44 | hellviolett mit weiß |
| 41 | carmoisin mit weiß | 45 | pfirsichblüthen mit weiß |
| 42 | scharlach mit weiß | 46 | hellrosa mit weiß |
| 43 | weiß mit purpur | 47 | dunkelviolett mit weiß |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 18 1½ |
| 502 | Beste Mischung ... à 200 K. 3 Sgr. | à 500 K. 7 Sgr. à Tl. 11 Rt. | à Lth. | — | 12 1 |
| 503 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 50 K. | | | — | 10 — |

### E. Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | dreifarbig | 54 | granatroth |
| 49 | pfirsichblüthen | 55 | purpur |
| 50 | weiß mit violett | 56 | scharlach |
| 51 | lilla | 57 | weiß mit scharlach |
| 52 | kupferroth | 58 | fleischfarben |
| 53 | dunkelblau | 59 | weiß |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 25 1½ |
| 505 | Beste Mischung ... à 200 K. 4 Sgr. | à 500 K. 10 Sgr. à Tl. Rt. | à Lth. | — | 20 1½ |
| 506 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. | | | — | 15 — |
| 507 | — — — — — 8 — | à 50 K. | | — | 10 — |

### F. Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 64 | granatroth mit weiß | 67 | hellblau mit weiß |
| 65 | leberfarben mit weiß | 68 | ziegelroth mit weiß |
| 66 | carmoisin mit weiß | 69 | fleischfarben mit weiß |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 508 | Jede Sorte separat | | à Lth. | — | 25 1½ |
| 509 | Beste Mischung ... à 200 K. 4 Sgr. | à 500 K. 10 Sgr. à Tl. Rt. | à Lth. | — | 20 1½ |
| 510 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 50 K. | | | — | 7½ — |

## Ritterſporn.

**Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedrige, extra gefüllte hyacinthenblüthige Ritterſporn** (eine sehr werthvolle Verbesserung).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 10 Farben, jede separat | | à Tl. 2 Rt. à Lth. | — | 3 1 |
| 516 | Beste Mischung | | à Tl. 1 Rt. à Lth. | — | 2 ½ |
| 517 | Ein Sortiment in 10 Farben à | ⅕ Lth. | | — | 8 — |
| 518 | — — — 6 — à | ⅕ Lth. | | — | 5 — |

**Delphinium elatior fl. pl., hohe extra gefüllte Ritterſporn.**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 519 | 8 Sorten, jede separat | | à Tl. 1½ Rt. à Lth. | — | 2 1 |
| 520 | Beste Mischung | | à Tl. ⅔ Rt. à Lth. | — | 1½ ½ |
| 521 | Ein Sortiment in 8 Farben à | ⅕ Lth. | | — | 6 — |
| 522 | — — — 6 — à | ⅕ Lth. | | — | 5 — |

**Delphinium Consolida fl. pl., Levkojen-Ritterſporn** in nur extra gefüllten Sorten, daher der hohe Preis.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 523 | 8 Sorten, jede separat | | à Tl. Rt. à Lth. | — | 6 1 |
| 524 | Beste Mischung | | à Tl. 4 Rt. à Lth. | — | 5 1 |
| 525 | Ein Sortiment in 8 Farben à | ⅕ Lth. | | — | 8 — |
| 526 | — — — 6 — à | ⅕ Lth. | | — | 6 — |

## Malven. (Althaea rosea fl. pl.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 527 | Extra gefüllte englische Malven in 24 Sorten | | à Lth. | — | 25 1½ |
| 528 | Beste Mischung | à Tl. 8 Rt. | à Lth. | — | 10 1 |
| 529 | Ein Sortiment in 24 Farben à 1 Pr. | | | — | 24 — |
| 530 | — — — 18 — | à 1 Pr. | | — | 18 — |
| 531 | — — — 12 — | à 1 Pr. | | — | 12 — |

## Hahnenkamm. (Celosia cristata.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 532 | 12 Sorten, jede separat | | à Lth. | — | 25 1½ |
| 533 | Beste Mischung I. Qualität | à Tl. 12 Rt. | à Lth. | — | 14 1 |
| 534 | Mischung II. Qualität | à Tl. 7 Rt. | à Lth. | — | 8 — |
| 535 | Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Pr. | | | — | 12 — |
| 536 | — — — 8 — | à 1 Pr. | | — | 8 — |

## Wohlriechende Wicken. (Lathyrus odoratus.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 537 | 8 Sorten, jede separat | | à Tl. 10 Sgr. à Lth. | — | 1 ½ |
| 538 | Beste Mischung | à 100 Tl. 20 Rt. | à Tl. 7 Sgr. à Lth. | — | 1 ½ |
| 539 | Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Pr. | | | — | 4 — |

## Wohlriechende Wunderblumen. (Mirabilis Jalappa.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 10 Sorten, jede separat | | à Tl. 1⅓ Rt. à Lth. | — | 2 1 |
| 541 | Beste Mischung | | à Tl. 1 Rt. à Lth. | — | 1½ ½ |
| 542 | Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Pr. | | | — | 8 — |
| 543 | — — — 6 — | à 1 Pr. | | — | 5 — |

## Extra gefüllter Garten-Mohn.

(Papaver somniferum fl. pl.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 544 | 16 Sorten, jede separat | | à Tl. 1 Rt. à Lth. | — | 1½ ½ |
| 545 | Beste Mischung | | à Tl. 15 Sgr. à Lth. | — | 1 ½ |
| 546 | Ein Sortiment in 16 Farben à 1 Pr. | | | — | 8 — |
| 547 | — — — 12 — | à 1 Pr. | | — | 6 — |

## Extra gefüllter Päonien-Mohn.

(Papaver paeoniflorum fl. pl.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 10 Sorten, jede separat | | à Tl. 1⅓ Rt. à Lth. | — | 2 1 |
| 549 | Beste Mischung | | à Tl. 20 Sgr. à Lth. | — | 1 ½ |
| 550 | Ein Sortiment in 10 Farben à 1 Pr. | | | — | 7 — |
| 551 | — — — 8 — | à 1 Pr. | | — | 5 — |

## Flammenblume. (Phlox Drummondii.)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 552 | Beste Mischung | | à Tl. 8 Rt. à Lth. | — | 10 1 |
| 553 | Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. | | | — | 12 — |
| 554 | — — — 8 — | à 1 Pr. | | — | 8 — |

## Verſchiedene Sortimente.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 555 | Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 prächtigen Nüancirungen | à 1 Pr. | | — | 10 — |
| 556 | — — — — 8 — | — à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 557 | Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken incl. der neuesten in 15 Sorten | à 1 Pr. | | — | 12 — |
| 558 | — — — — — — 12 — | à 1 Pr. | | — | 10 — |
| 559 | — — — — — — 8 — | à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 561 | Ipomoea purpurea, hochwachsende Winden in 12 Sorten | à 1 Pr. | | — | 9 — |
| 562 | — — — — — 8 — | à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 563 | — feine Topfsorten in 12 verschiedenen Arten | à 1 Pr. | | — | 15 — |
| 564 | Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes Kreuzkraut in 8 Sorten | à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 565 | Tagetes, Sammetblumen in 12 extra gefüllten Sorten | à 1 Pr. | | — | 9 — |
| 566 | — — — 8 — — | — à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 567 | Petunia hybrida in 8 Nüancirungen | à 1 Pr. | | — | 12 — |
| 568 | Portulaca in 8 Farben | à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 569a | — grandiflora **fl. pl., I. Qualität, prachtvolle Neuheit** (liefert ¾ Gefüllte aus Samen) | à 1000 K. 35 Sgr. à 100 K. 5 Sgr. à 50 K. 3 Sgr. | | | |
| 569b | — — — in 4 Farben | à 25 Korn | | — | 15 — |
| 569c | — — — — 4 — | à 50 Korn | | — | 30 — |
| 570 | Primula chinensis, beste gefranzte Primeln in 6 Sorten | à 1 Pr. | | — | 18 — |
| 572 | Zinnia elegans in 6 schönen Sorten | à 1 Pr. | | — | 5 — |
| 574 | — — **fl. pl., extra gefüllte** in 4 Sorten | à 1 Pr. | | — | 5 — |
| 575 | Gomphrena globosa, Kugelamaranth in 5 Sorten | à 1 Pr. | | — | 4 — |
| 576 | Helichrysum monstrosum, extra gefüllte Strohblumen in 6 Sorten | à 1 Pr. | | — | 5 — |
| 576a | Scabiosa major in 6 Farben | à 1 Pr. | | — | 4 — |
| 576b | — nana — 6 — | à 1 Pr. | | — | 4 — |
| 577 | Solanum Melongena, Eierpflanze in 6 Sorten | à 1 Pr. | | — | 5 — |
| 578 | Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in 6 Sorten | à 1 Pr. | | — | 5 — |
| 580 | Tropaeolum Lobbianum hybridum in 16 prachtvollen Sorten | à 1 Pr. | | — | 16 — |
| 581 | — — — — 12 — | — à 1 Pr. | | — | 12 — |
| 582 | — — — — 8 — | — à 1 Pr. | | — | 8 — |
| 585 | Speise-Kürbis in 12 sehr großfrüchtigen Sorten | à 1 Pr. | | — | 10 — |
| 586 | — — — 8 — — | — à 1 Pr. | | — | 7 — |
| 589 | Zier-Kürbis in 24 sehr zierlich geformten Sorten | à 1 Pr. | | — | 14 — |
| 590 | — — — 12 — — | — à 1 Pr. | | — | 7 — |
| 591 | Zier-Gräser in 50 Sorten | à 1 Pr. | | 1 | — — |
| 592 | — — — 25 — | à 1 Pr. | | — | 15 — |
| 593 | — — — 12 — | à 1 Pr. | | — | 8 — |
| 594 | Stauden in 50 sehr schönen Sorten | à 1 Pr. | | — | 25 — |
| 595 | — — 25 — — | — à 1 Pr. | | — | 15 — |
| 596 | — — 12 — — | — à 1 Pr. | | — | 8 — |
| 597 | Sommerblumen in 100 sehr schönen Sorten | à 1 Pr. | | 1 | 20 — |
| 598 | — — 50 — — | — à 1 Pr. | | — | 25 — |
| 599 | — — 25 — — | — à 1 Pr. | | — | 12 — |
| 600 | — — 12 — — | — à 1 Pr. | | — | 6 — |
| 601 | — zu Einfassungen in 25 schönen Sorten | à 1 starke Pr. | | — | 18 — |
| 602 | — — — — 18 — | — à 1 — Pr. | | — | 14 — |
| 603 | — — — 12 — | — à 1 — Pr. | | — | 9 — |

Zu Einfassungen sind Sorten gewählt, die gleich in den Garten auf die Stelle gesäet werden können.

**Erklärung der Zeichen:** ⊙ einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet, und größtentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige Blumen. ♄ strauchartige Topfpflanzen. *w* Blumen, die warm stehen wollen. ♃ perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. *t* Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. *E* zwei- oder mehrjährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

| № | | | | à Tl. Rt. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Abronia umbellata | *tm* | wohlriechende, doldenförmige, lillarothe Abronie, kriechend | 4 | 5 | 1 |
| 702 | Acacia albicans | ♄ | à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 1½ |
| 703 | — argyrophylla | ♄ | à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 1½ |
| 704 | Acacia dealbata | ♄ | à 1000 K. 1 Rt. à 100 K. 4 Sgr. | — | — | 1½ |
| 705 | — Farnesiana | ♄ | | — | 3 | 1 |
| 706 | — ixiophylla | ♄ | à 1000 K. 1 Rt. à 100 K. 4 Sgr. | — | — | 1½ |
| 707 | — glomerata | ♄ | | — | 4 | 1 |

| № | | | | à tl. Rt. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | Acacia Julibrissin | ♄ | | — | 3 | 1 |
| 709 | — leptophylla | ♄ | | — | 2 | 1 |
| 711 | — longifolia | ♄ | à 100 K. 8 Sgr. | — | — | 1½ |
| 712 | — longissima elegans | ♄ | à 1000 K. 40 Sgr. à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 1½ |
| 713 | — — glauca pendula | ♄ | à 100 K. 10 Sgr. | — | — | 2 |
| 714 | — **lophanta** | ♄ | | 2 | 3 | 1 |
| 715 | — — **speciosa** | ♄ | à 100 K. 15 Sgr. | — | 25 | 2½ |
| 716 | — Meissnerii | ♄ | à 100 K. 15 Sgr. | — | — | 2½ |
| 717 | — mucronata | ♄ | à 100 K. 12 Sgr. | — | — | 2 |
| 718 | — Neumannii | ♄ | | — | 4 | 1 |
| 719 | — pulchella | ♄ | à 100 K. Sgr. | — | — | — |
| 720 | — verticillata | ♄ | à 100 K. 10 Sgr. | — | — | 2 |
| 721 | — tenuifolia | ♄ | à 100 K. 10 Sgr. | — | — | 2 |
| 722 | — trinervis | ♄ | à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 1½ |
| 723 | — xylophylloides | ♄ | à 100 K. 8 Sgr. | — | — | 1½ |
| 724 | Acanthus mollis | 4 | unbewehrter Bärenklau | — | 2 | |
| 725 | Acroclinium roseum | *mt* | hübsche rosenrothe Immortelle, zierend gleich der **Rhodanthe Manglesii** | 2 | 3 | 1 |
| 726 | — — fl. albo | *mt* | glänzend weiße | 2 | 3 | 1 |
| 727 | Adenophora latifolia | 4 | Drüsenglocke, sehr hübsch | — | 30 | 2 |
| 728 | Adonis aestivalis | ☉ | Sommer-Adonisröschen | 2/3 | 1½ | ½ |
| 729 | — autumnalis | ☉ | Herbst- — | 2/3 | 1½ | ½ |
| 730 | — vernalis | 4 | Frühlings- — | 1 | 1½ | ½ |
| 731 | Adlumia cirrhosa | ♂§ | rankende Adlumie | — | — | 1 |
| 732 | Aethionema Buxbaumii | ☉* | Steintäschel, interessante Samenbildung | — | 6 | 1 |
| 735 | Ageratum coeruleum | *m* | Leberbalsam, blauer | — | 5 | 1 |
| 737 | — mexicanum | *m* | mexicanischer, blaublühender | 2 | 3 | ½ |
| 738 | — — nanum | *m** | 8" hoher Zwerg- | — | 6 | 1 |
| 739 | — — albiflorum | *m* | weißlicher | — | 6 | 1 |
| 740 | — — — nanum | *m* | — Zwerg- | — | 12 | 1 |
| 741 | Agrostemma coronaria | ♂ | rothe Vexirnelke, prachtvolle Farbe | 2/3 | 1 | ½ |
| 742 | — — bicolor | ♂ | zweifarbige | 2/3 | 1 | ½ |
| 743 | — — fl. albo | ♂ | weißblühende | 2/3 | 1 | ½ |
| 744 | — flos Jovis | 4 | Jupitersblume, hochrosafarbig | 2/3 | 1 | ½ |
| 745 | Alonsoa grandiflora | *mt* | prachtvolle scharlachrothe Halbblume | 4½ | 6 | 1 |
| 746 | — Warscewiczii | *mt* | — mennigrothe | 4½ | 6 | 1 |
| 747 | Alstroemeria de Chili | *t*4 | von Chili, in schönen Nüancen | — | 8 | 1 |
| 748 | Althaea rosea fl. pl. | ♂ | extra schöne englische Sorten gemischt | 8 | 10 | 1 |
| 749 | — — — | ♂ | gewöhnliche gefüllte Stockrose oder Malve gemischt | 4 | 5 | 1 |
| 750 | — — — | ♂ | Goldmalve, extra gefüllt u. constant | — | 8 | 1 |
| 752 | — — — | ♂ | rein gelb } liefern nur gefüllte | — | 15 | 1 |
| 753 | — — — | ♂ | rein rosa } Stöcke. | — | 15 | 1 |
| 754 | — — fl. nigro | ♂ | einfache schwarze Malve, als Farbestoff bekannt | 2/3 | 1 | ½ |
| 755 | — chinensis fl. pl. | ♂ | in schöner Melange | — | 10 | 1 |
| | — **rosea fl. pl.** | ♂ | die übrigen siehe Sortimente. | | | |

Malven aus Samen gezogen liefern ganz vorzügliche Resultate, weshalb wir die Anzucht durch denselben sehr empfehlen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 756 | Alyssum Benthamii | *m** | Bentham's duftendes Steinkraut | 4 | 5 | 1 |
| 758 | — saxatile compactum | 4 | neue Varietät, compact gebaut und sehr reichblühend, echt | — | 50 | 2½ |
| 759 | — Wierzbickii | 4 | Wierzbicki's | — | — | 1 |
| 760 | Amarantus bicolor | *tm* | zweifarbiger Amaranth | 2½ | 4 | 1 |
| 761 | — cruentus | ☉ | dunkelrother Fuchsschwanz | 5/6 | 1 | ½ |
| 762 | — **melancholicus ruber** | *m* | neu. Die Blätter sind von dunkelpurpurbrauner Farbe, ähnlich der Perille nankinensis, aber weit größer. Die Pflanze wird 1½' hoch und baut sich sehr schön pyramidenförmig | 2 | 3 | ½ |
| 763 | — monstrosus | ☉ | schöner monströser | 3/4 | 1½ | ½ |
| 764 | — pendulus | ☉ | hängender rother | 2/5 | 1 | ½ |
| 765 | — sanguineus | ☉ | blutrother | 2/5 | 1 | ½ |
| 766 | — tricolor | *tm* | dreifarbiger | 2½ | 4 | 1 |
| 767 | — viridis | ☉ | grüner | 2/3 | 1 | ½ |
| 768 | Amaryllis Tettaui (Hippeastr. robust.) | *tw* | starke Sternamaryllis, schöne brasilianische Species à 100 K. 25 Sgr. | — | — | 3 |
| 769 | Ammobium alatum | *m*♂*E* | Sandimmortelle, geflügelt, sehr schön zu Kränzen und Bouquets | 2 | 3 | ½ |
| 770 | Anagallis **grandiflora** carnea | *tm* | fleischfarbige | — | 12 | 1 |
| 771 | — — coccinea | *tm* | scharlachrothe | — | 12 | 1 |
| 772 | — — coerulea | *tm* | dunkelblaue | — | 12 | 1 |
| 773 | — — lillacina | *tm* | lillafarbige | — | 12 | 1 |
| 774 | — — cupreata sanguinea | *tm* | prachtvoll dunkelkupferroth | — | 20 | 1½ |
| 775 | — — Eugenie | *tm* | hellblau und lilla, weißlich gerändert | — | 20 | 1½ |
| 776 | — — Napoleon III. | *tm* | bräunlich carmoisin | — | 20 | 1½ |
| 777 | — — | *tm* | vorstehende Sorten gemischt | — | 14 | 1 |
| 778 | Anchusa incarnata | ♂*E* | fleischfarbene | 2 | 3 | ½ |
| 779 | — italica | ♂*E* | italienische Ochsenzunge, blau, schön | 2 | 3 | 4½ |
| 780 | — officinalis | ♂*E* | schön blaublühend, niedrig | 2 | 3 | ½ |
| 781 | Anomatheca cruenta (Ixia corymbosa) | *t* | kleines blutrothes Zwiebelgewächs | — | 40 | 2 |
| 782 | Anthemis arabica | ☉ | arabische Kamille | 2 | 3 | ½ |
| 784 | Antirrhinum majus | ♂*E* | großes Löwenmaul in vielen Nüancen | 1½ | 2 | ½ |
| 785 | — — fl. albo | ♂*E* | rein weißes | 3 | 4 | 1 |
| 787 | — — striatum | ♂*E* | prachtvolle gestreifte Varietäten | 4 | 5 | 1 |
| 789 | — — Brillant | ♂*E* | dreifarbiges, niedriges, leuchtend scharlach, goldgelb und weiß | 5 | 6 | 1 |
| 790 | — — Crescia | ♂*E* | dunkelscharlach | 4 | 5 | 1 |
| 791 | — — Delila | ♂*E* | carmin u. gelb m. weißem Schlund | 4 | 5 | 1 |
| 792 | — — Firefly | ♂*E* | orangescharlach und gelb mit weißem Schlund | 4 | 5 | 1 |
| 793 | — — Galathée | ♂*E* | carmoisin mit weißem Schlund, großblumig | 4 | 5 | 1 |
| 794 | — — Ghestia | ♂*E* | dunkelblutroth mit feiner dunkler Belaubung | 4 | 5 | 1 |
| 795 | — — Henry IV. | ♂*E* | leuchtend zinnober | 4 | 5 | 1 |
| 796 | — — Papilionaceum | ♂*E* | hochpurpurroth mit weiß | 5 | 6 | 1 |
| 797 | — — | ♂*E* | vorstehende Sorten gemischt, I. Qual. | 3 | 4 | 1 |
| 798 | Aquilegia canadensis elatior | 4 | hohe canadische, hellscharlachroth | — | — | 1 |
| 799 | — — humilis | 4 | niedrige — — | — | 12 | 1 |
| 800 | — caryophylloides | 4 | neu, prachtvoll roth gestreift und gefleckt | — | — | — |
| 801 | — Durandii fl. pl. | 4 | gestreifte, prachtvoll, variirt | 5 | 6 | 1 |
| 802 | — formosa | 4 | gefüllte niedrige blaue | 3 | 4 | 1 |
| 803 | — — fl. roseo pl. | 4 | brillant rosenrothe | 3 | 4 | 1 |
| 804 | — — fl. **rubro** pl. | 4 | neue rothe, prachtvolle Sorte | 3 | 4 | 1 |
| 805 | — **Skinnerii** | 4 | Skinner's prächtige orangenrothe à 1000 K. 10 Sgr. | — | — | 2 |
| 806 | — vulgaris fl. pl. | 4 | gefüllte Ackelei in vielen prachtvollen Nüancen | 1 | 1½ | ½ |
| 808 | Arctotis breviscapa | *m** | kurzschaftiges Bärohr, sehr effectvoll | — | 15 | 1 |
| 809 | — breviscapa sulphurea | *m** | schwefelgelbe Varietät, desgl. | — | 15 | 1 |
| 810 | Argemone albiflora | *m* | weißblühender Stachelmohn | 2/3 | 4 | 1 |
| 811 | — platyceras grandiflora | *m* | sehr großblumiger weißblühender | 2/3 | 4 | 1 |
| 812 | — speciosa | *m* | gelbblühender | 2/3 | 4 | 1 |
| 813 | Armeria cephalodes | 4*t* | prächtige rosenrothe Grasnelke | — | 90 | 4 |
| 814 | — formosa | 4 | sehr schöne Grasnelke | 3 | 4 | 1 |
| 815 | Armeria formosa alba | 4 | weiße | — | — | 1 |
| 816 | — pinifolia | 4*t* | nadelblättrige | — | 10 | 1 |
| 817 | Asclepias curassavica | 4*t* | südamerikanische Seidenpflanze | — | 6 | 1 |
| 818 | — incarnata | 4 | schöne fleischrothe | — | 18 | 1½ |
| | **Aster** | ☉ | siehe Sortimente. | | | |
| 820 | — tenellus (Felicia tenella) | ☉ | zarte Sternblume | — | 5 | 1 |
| 822 | Athanasia annua | *m* | Unsterblichkeitsblume, zierlich | — | 4 | 1 |
| 823 | Atriplex hortensis purpurea | ☉ | blutrothe Gartenmelde | ⅕ | 1 | ½ |
| 824 | Bartonia aurea | ☉ | schöne goldgelbe Bartonie | 1½ | 2 | 1½ |
| 825 | Bellis perennis | 4* | Maasliebchen, von gefüllten und halbgefüllten Blumen | — | 30 | 2 |
| 826 | — — fl. pl. | 4* | von Blumen **I. Ranges** gesammelt, woraus dennoch ein Theil geringe fallen | — | 80 | 4 |
| 827 | Beta Cicla brasiliensis | ♂ | in 4 Sorten, jede separat | ⅓ | 1 | ½ |
| 828 | — — — | ♂ | schöner Mangold mit gold-, weiß-, roth- und sonstigen schön geaderten Blättern | 4/15 | 1 | ½ |
| 830 | Bidens atrosanguinea (Ortgies), Cosmos diversifolius (Hooker), Dahlia Zimapanii (Roezl) | *m* | neu, mit Blumen von blutbrauner Farbe | — | 50 | 2½ |
| 831 | Brachycome iberidifolia | *m** | schleifenblumenblättriger Kurzschopf | 8 | 10 | 1 |
| 832 | — — fl. albo | *m** | großblumiger weißer | — | 10 | 1 |
| 833 | Brassica oleracea | ♂ | weißgescheckter Zierkohl, extra | — | 4 | 1 |
| 834 | — — | ♂ | braungescheckter — — | — | 4 | 1 |
| 835 | Browallia Czerwiakowskii | *mt* | großblumige Browallie | — | 12 | 1 |
| 836 | — demissa | *mt* | niedrige blaßblaue | — | 20 | 1½ |
| 837 | — elata fl. albo | *mt* | hohe weiße | — | 8 | 1 |
| 838 | — — coeruleo | *mt* | hohe blaue | — | 8 | 1 |
| 839 | — — grandiflora coerulea | *mt* | großblumige dunkelblaue | — | 12 | 1 |
| 840 | Bryonia alba | 4§ | weiße Zaunrübe | 2½ | 4 | 1 |
| 841 | Buphthalmum cordifolium | 4 | schöne Blattpfl. auf Rasenplätzen | 4 | 5 | 1 |
| 842 | — salicifolium | 4 | weidenblättrige, desgleichen | 4 | 5 | 1 |
| 843 | Cacalia sonchifolia (Emilia flammea) | *m* | hochrothe Pestwurz | 4 | 5 | 1 |
| 844 | — — fl. luteo | *m* | hochgelbe | 4 | 5 | 1 |
| 845 | Cajophora lateritia (Loasa lateritia) | *Et*§ | Fackelträger, prächtig ziegelroth | 8 | 10 | 1 |
| 846 | Calampelis puniceus | ♂*m*§ | neue dunkelrothe Schönrebe | — | 22 | 1½ |
| 847 | — scaber (Ecremocarpus scaber) | ☉4*t* | Schönheitsrebe | — | 16 | 1 |
| 848 | Calandrinia Buridgii | ☉ | kupferfarbene Calandrinie | 1⅓ | 2 | ½ |
| 849 | — grandiflora | *m* | großblumige, 2' hohe, sehr schön | 4 | 5 | 1 |
| 850 | — Lindleyana | ☉ | Lindley's ½' hohe | 1 | 1½ | ½ |
| 851 | — speciosa nova | *m* | prächtige, 1½' hohe | — | 5 | 1 |
| 852 | — umbellata | 4*tE* | doldenblüthige, prachtvolles Topfgewächs | — | 12 | 1 |
| 853 | **Calceolaria hybrida** | ☉4*t* | krautartige, von den **allerschönsten getigerten und punktirten** Sorten in den mannigfaltigsten Farben, mit brillanter Zeichnung, von nur gegenseitig befruchteten Stöcken gesammelt à Lth. 24 Rt. | | | |
| | | | 1 Prise von über 1000 K. 6 Sgr. | — | — | 6 |
| | | | 50 Portionen desgl. 6 Rt. | | | |
| 854 | — — | ☉4*t* | wie vorstehende, jedoch nur von den **neuesten großblumig. rundgebaueten getuschten** Sorten gesammelt à Lth. 15 Rt. | | | |
| | | | 1 Prise von über 1000 K. 5 Sgr. | — | — | 5 |
| | | | 50 Portionen desgl. 5 Rt. | | | |
| 855 | — — | ☉4*t* | die vorstehend bezeichneten **getuschten und getigerten** melirt à Lth. 20 Rt. | | | |
| | | | 1 Prise von über 1000 K. 5½ Sgr. | — | — | 5½ |
| | | | 50 Portionen desgl. 5½ Rt. | | | |
| 856 | — — **nana** | ☉4*t* | niedrige, 8" hohe, überaus reichblühende **getigerte Zwerg-**, prachtvoll à Lth. Rt. | | | |
| | | | 1 Prise von über 1000 K. 8 Sgr. | — | — | 8 |
| | | | 50 Portionen desgl. 8 Rt. | | | |
| 857 | — — — | ☉4*t* | **frühblühende getuschte Zwerg-**, sehr empfehlenswerth à Lth. Rt. | | | |
| | | | 1 Prise von über 1000 K. 8 Sgr. | — | — | 8 |
| | | | 50 Portionen desgl. 8 Rt. | | | |

Unsere Calceolarien sind so vorzüglich, daß sie von den besten belgischen nicht übertroffen werden. Cultur-Anweisungen werden auf Verlangen dem Samen beigelegt.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 858 | Calceolaria **rugosa var.** | *t* | **strauchartige**, in vielen neuen großblumigen prachtvollen Varietäten à 1000 K. 10 Sgr. | — | — | 10 |
| 859 | — **pinnata** | *m* | gefiedertblättrige Pantoffelblume, echt und schön | — | 15 | 1 |
| 860 | — scabiosaefolia | *m* | wie californica, nur früher und voller blühend | 6 | 8 | 1 |
| 861 | — spec. de Californica | *m* | gelbblühend, für Gruppen schön | 6 | 8 | 1 |
| 862 | Calendula hybrida (Dimorphotheca hybr.) | ☉ | weißblühende Ringelblume | 1½ | 2 | ½ |
| 863 | — pluvialis (Dimorph. pluvialis) | ☉ | Regen anzeigende | 1½ | 2 | ½ |
| 864 | — Pongei fl. pl. | ☉ | weißblühende gefüllte | 3 | 4 | 1 |
| 865 | — officinalis fl. pl. ranunculoides | ☉ | gefüllte gelbe | 1 | 1½ | ½ |
| 866 | — — superba fl. pl. | ☉ | verbesserte Varietät in mehreren Nüancen, extra gefüllt | 1 | 1½ | ½ |
| 867 | Calliopsis Atkinsonii | ♂*E* | vielblühendes, gelbes Schöngesicht | 2 | 3 | ½ |
| 868 | — bicolor | *m* | zweifarbiges | 1½ | 2 | ½ |
| 869 | — cardaminifolia hybrida | ☉ | schaumkrautblättriges Schöngesicht, die schönste aller Calliopsis, sowohl für Gruppen, wie als Einzelpflanze im Rasen. Sie wird 2' hoch, baut sich kugelpyramidenförmig, verzweigt sich sehr stark und ist so vielblumig, daß eine Pflanze Tausende von Blüthen bringt. Um dies Resultat zu erzielen, müssen die Pflanzen wenigstens 2' weit gepflanzt werden | | | |
| 870 | — card. hybr. atrosanguinea | ☉*m* | blutbraun (theilweise marmorirt) | — | 15 | 1 |
| 871 | — coronata | *m* | gekröntes | — | 16 | 1 |
| 872 | — **Drummondii** (basalis) | *m* | Drummond's prächtiges | 4 | 5 | 1 |
| 873 | — fistulosa | *m* | geröhrtes | 1⅓ | 2 | ½ |
| 874 | — marmorata | *m* | prächtig marmorirt | 1½ | 2 | ½ |
| 875 | — nana | *m* | 8" hohes Zwerg- (variirt) | 1½ | 2 | ½ |
| 876 | — — marmorata | *m* | marmorirtes Zwerg- | 4 | 5 | 1 |
| 877 | — — purpurea | *m* | purpurrothes — | 4 | 5 | 1 |
| 878 | — **nigra speciosa** | *m* | rein dunkelblutbraunes, prachtvoll leuchtendes | 4 | 5 | 1 |
| 879 | — splendens | *m* | beste Sorten gemischt | 1½ | 2 | ½ |
| 880 | — | *m* | mit großen, schönen, glänzend carmoisinrothen Blumen, sehr reich und lange blühend, wird 3' hoch | 1½ | 2 | ½ |
| 881 | Callirhoë pedata | 4*m* | Zwerg-, wird nur 1' hoch | 5 | 6 | 1 |
| 882 | — — nana | 4*m* | breitzungiger Schönstrahl | — | 25 | 1½ |
| 883 | Callichroa platyglossa | ☉ | chilesische, hübsch | 2½ | 4 | 1 |
| 884 | Calyxhymenia chilensis | *m* | carpathische Glockenblume | — | 8 | 1 |
| 885 | Campanula carpathica | 4* | rein weiße | 3 | 4 | 1 |
| 886 | — — fl. albo | 4* | vortreffliche Glockenblume | — | 5 | 1 |
| 887 | — eximia | ♂ | große Glockenblume | 3 | 4 | 1 |
| 888 | — grandis | 4 | | — | 10 | 1 |

| № | | | | | à Rk. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 889 | Campanula | grandis fl. albo | ♃ | schöne weiße | — | 30 | 2 |
| 890 | — | gummifera | ♃ | gummigebende | — | 10 | 1 |
| 891 | — | lactiflora | ♃ | milchweiße, sehr schöne, reichblühende 4′ hohe Gruppenpflanze | — | 6 | 1 |
| 892 | — | Loefflingii | *m* | Loeffling'sche | — | — | 1½ |
| 893 | — | Loreyi | *m* | Lorey's hübsche blaue und weiße gemischt | — | 6 | 1 |
| 894 | — | — fl. albo | *m* | rein weiße | — | 6 | 1 |
| 895 | — | — — coeruleo | *m* | rein blaue | — | 6 | 1 |
| 896 | — | macrantha | ♃ | großblumige blaue, 3′ hoch, schön | 5 | 6 | 1 |
| 897 | — | Medium fl. albo | ♃ | weiße, großglockige Marienglockenblume | — | 5 | 1 |
| 899 | — | — — coeruleo | ♃ | großglockige blaue | — | 3 | ½ |
| 900 | — | — — — pl. | ♃ | gefüllte (variirt) | — | 12 | 1 |
| 902 | — | nobilis fl. albo | ♃ | weißblühende Glockenblume | — | 20 | 1½ |
| 903 | — | pyramidalis | ♂*t* | pyramidenartige blaue | — | 10 | 1 |
| 904 | — | — fl. albo | ♂*t* | rein weißblühende | — | 25 | 2 |
| 905 | — | rotundifolia | ♃ | rundblättrige, hübsch, 9″ hoch | — | — | 1 |
| 906 | — | — fl. albo | ♃*E* | — weiße | — | — | 1 |
| 907 | — | Speculum (Specularia Speculum) | ⊙* | Venusspiegel, blaublühender | 1/6 | 2 | ½ |
| 908 | — | — fl. albo | ⊙* | weißer | 1/3 | 2 | ½ |
| 909 | — | — — lillacino | ⊙* | lillafarbiger | 1/3 | 2 | ½ |
| 910 | — | — grandiflora | ⊙* | großblumiger, blauer | 1/6 | 2 | ½ |
| 911 | — | — | ⊙* | vorstehende 4 Sorten gemischt | 1/3 | 2 | ½ |
| 912 | — | stricta (littoralis) | *m* | schöne hellblaue | — | 10 | 1 |
| 913 | Canna | diverse species | ♃*tw* | Blumenrohr, in verschiedenen Sorten gemischt | 1/3 | 2 | 1 |
| 914 | — | bicolor de Java | ♃*tw* | zweifarbiges von Java | — | 4 | 1 |
| 915 | — | coccinea vera | ♃*tw* | scharlachrothblühendes | ½ | 2½ | 1 |
| 916 | — | compacta elegantissima | ♃*tw* | kupferrothes, schön | 2 | 3 | 1 |
| 917 | — | crocea | ♃*tw* | schöne Pflanze; effectvoll durch ihr Laubwerk und ihre schönen Blumenähren von safrangelbem Roth | ½ | 2½ | 1 |
| 918 | — | gigantea | ♃*tw* | riesiges, extra | — | 6 | 1½ |
| 919 | — | indica superba | ♃*tw* | schönes indisches | ½ | 2½ | 1 |
| 920 | — | lutea picta | ♃*tw* | bemaltes gelbes | ½ | 2½ | 1 |
| 921 | — | **Müllerii** | ♃*tw* | prachtvoll, neu, schöner als Warscewiczii, in allen Theilen größer als dieses | ½ | 2½ | 1 |
| 922 | — | Sellovii | ♃*tw* | sehr blumenreiche Pflanze mit schönen Blumenähren von prächtigem Roth | ½ | 2½ | 1 |
| 923 | — | speciosa | ♃*tw* | schönstes | ½ | 2½ | 1 |
| 924 | — | spectabilis | ♃*tw* | ansehnliches | ½ | 2½ | 1 |
| 925 | — | **Warscewiczii** | ♃*tw* | sehr beliebtes reichblühendes | 1/3 | 2 | 1 |
| 926 | Cannabis | gigantea | *m* | echter Riesenhanf aus China, eine schöne 10—15′ hohe Gruppenpflanze | ½ | 1 | ½ |
| 927 | Capsicum | annuum | *mt* | spanischer Pfeffer | ½ | 2 | ½ |
| 928 | — | — | *mt* | gelber beerenförmiger | — | 6 | 1 |
| 929 | — | — | *mt* | rother — | — | 6 | 1 |
| 930 | — | — | *mt* | gelber schnabelförmiger | — | 6 | 1 |
| 931 | — | — | *mt* | rother — | — | 6 | 1 |
| 932 | — | — | *mt* | mit schwarzer Frucht | — | 6 | 1 |
| 933 | — | — | *mt* | rother taschenförmiger monströser | — | 6 | 1 |
| 934 | — | — | *mt* | gelber — — | — | 6 | 1 |
| 935 | Carduus | nigrescens | ♂ | purpurrothe nelkenblüthige Distel | — | 15 | 1 |
| 936 | Carthamus | tinctorius | ⊙ | färbender Saflor | ¼ | 1 | ½ |
| 937 | Catananche | bicolor fl. pl. | ♃ | zweifarbige gef. Rasselblume, schön | 2 | 3 | ½ |
| 938 | — | coerulea fl. pl. | ♃ | blaue gefüllte Rasselblume, schön | 2 | 3 | ½ |
| 939 | Celosia | cristata macrocephala gigantea | *mt* | leuchtendrother Hahnenkamm | — | 25 | 1½ |
| 940 | — | — pyramidalis aurea | *mt* | goldgelber, neuer pyramidenförmiger, vielkämmiger | — | 8 | 1 |
| 941 | — | — — coccinea | *mt* | scharlachrother desgl. | — | 8 | 1 |
| 942 | — | — nana purpurea | *mt* | niedriger braunrother echter Zwerg- | — | 18 | 1½ |
| 943 | — | — — aurea | *mt* | dunkelgelber Zwerg- | — | 30 | 2 |
| 944 | — | — — lutea | *mt* | gelber — | — | 30 | 2 |
| 945 | — | — — rosea | *mt* | rosenrother — | — | 30 | 2 |
| | — | — | *mt* | die übrigen siehe Sortimente. | | | |
| 946 | Centaurea | americana | *m*⊙ | großblumige schöne Flockenblume | — | 6 | 1 |
| 947 | — | coelolepis | ♃ | hochschuppige | — | 5 | 1 |
| 948 | — | Cyanus | ⊙ | Kornblume, in vielen Farben gem. | ¾ | 1½ | ½ |
| 953 | — | depressa | ⊙ | schöne blaue, 1½′ hohe | 2 | 3 | ½ |
| 954 | — | — fl. roseo | ⊙*m* | rosenrothe | 2 | 3 | ½ |
| 955 | — | involucrata | ⊙ | eingehüllte Flockenblume | 2 | 3 | ½ |
| 956 | — | macrocephala | ♃ | großköpfige goldgelbe | — | 4 | 1 |
| 957 | — | montana | ♃ | Bergflockenblume, sehr schöne blaue | — | 22 | 1½ |
| 958 | — | (Amberboa) moschata fl. albo | ⊙ | weiße bisamduftende | 1/3 | 2 | ½ |
| 959 | — | — — fl. coeruleo | ⊙ | blaue — | 1/2 | 2 | ½ |
| 960 | — | — suaveolens (Amberboa odor.) | ⊙ | wohlriechende gelbe Bisamblume | — | 5 | 1 |
| 961 | Centauridium | Drummondii | *m* | leuchtend citronengelb, 2′ hoch | 4 | 5 | 1 |
| 962 | Centranthus | macrosiphon | ⊙ | rothblühende Spornblume, hübsch | 1/2 | 2 | ½ |
| 963 | — | — fl. albo | ⊙ | rein weißblühend | 1/3 | 2 | ½ |
| 964 | — | — fl. carneo | ⊙ | fleischfarbene | 1/3 | 2 | ½ |
| 965 | — | — nanus | ⊙ | rothe Zwerg- | 2 | 3 | ½ |
| 966 | Cerinthe | auriculata | ⊙*m* | geöhrte Wachsblume | — | 4 | 1 |
| 967 | — | gymnandra | ⊙ | die schönste aller Cerinthen | 1/6 | 3 | ½ |
| 968 | — | major | ⊙ | große Wachsblume | 2 | 3 | ½ |
| 970 | — | retorta | ⊙ | zurückgedrehete, buntblättrige | 4 | 5 | 1 |
| 971 | Chaenostoma | fastigiatum | *m** | schöner rothblühender Weitmund | — | 8 | 1 |
| 972 | — | — fl. albo | *m** | neuer rein weißer | — | 30 | 2 |
| 973 | — | polyanthum | *m** | lillafarbiger, sehr reichblühend | — | 5 | 1 |
| 975 | Chamaerops | humilis | ♃*t* | **Zwerg-Fächer-Palme** | 5/6 | 1½ | ½ |
| | | **Levkojen** | | siehe Sortimente. | | | |
| | | **Goldlack** | | — — | | | |
| 976 | Cheiranthus | **maritimus** | ⊙* | rothe Meer-Levkoje | 2 | 1½ | ½ |
| 977 | — | — fl. albo | ⊙* | weiße — | 2/3 | 1½ | ½ |
| 978 | Chelone (Penstemon) | **barbata** | ♃ | bärtige Chelone, prächtig | 4 | 5 | 1 |
| 979 | — | — — **coccinea** | ♃*E* | dunkelrothe, extra | — | 10 | 1 |
| 980 | — | — campanulata | ♃ | lillafarbige, sehr reichblühende, prachtvoll | — | 8 | 1 |
| 981 | Chenopodium | Atriplicis (purpurescens) | *m* | purpurröthlicher Gänsefuß, schöne Blattpflanze für Gruppen, 5′ hoch | 3 | 4 | 1 |
| 982 | Chrysanthemum | carinatum elegans | *m* | weiße Goldwucherblume | 2 | 3 | ½ |
| 983 | — | — fl. luteo | *m* | gelbe — | 2 | 3 | ½ |
| 984 | — | — tricolor Burid-gianum | ⊙ | schön, geringelt | 2 | 3 | ½ |
| 985 | — | — — venustum | ⊙ | desgl., getuscht | 2 | 3 | ½ |
| 986 | — | coronarium fl. albo pl. | *m* | gefüllte weiße | 1 | 1½ | ½ |
| 987 | — | — fl. luteo pl. | *m* | — gelbe | 1 | 1½ | ½ |
| 989 | — | rigidum fl. pl. | *m* | gefüllteste | — | 10 | 1 |
| 991 | **Cineraria** | **hybrida div. species** | ♃*t* | **1. Ranges**, von den besten Nummerblumen gesammelt | — | 240 | 6 |
| 992 | — | — — — — | ♃*t* | 2. Ranges, gemischt | — | 45 | 2 |
| 993 | — | — **nana** | ♃*t* | neue **Zwerg-** von niedrigem, compactem Habitus und von Nummerblumen 1. Ranges gesammelt | — | 300 | 8 |
| 994 | — | Webbii var. hybr. (Jühlke) | ♃*t* | neue, sehr hohe Species | — | 180 | 4 |

Unsere Collection von Cinerarien hat auch in diesem Jahre wieder allgemeine Bewunderung erregt.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Cirsium | pulchrum | ♃ | schöne, 4—5′ hohe Feder-Distel | — | 5 | 1 |
| 96 | Clarkia | elegans | ⊙ | violettrothe Clarkie | 1 | 1½ | ½ |
| 997 | Clarkia | neriiflora fl. carneo pl. | ⊙ | gefüllte fleischfarbige | 3 | 4 | 1 |
| 999 | — | — — roseo pl. | ⊙ | gefüllte rosenrothe oleanderblüthige | 2 | 3 | ½ |
| 1000 | — | — — violaceo pl. | ⊙ | schöne gefüllte violette | 2 | 3 | ½ |
| 1001 | — | pulchella | ⊙* | schöne Clarkie, roth | ¾ | 1½ | ½ |
| 1002 | — | — fl. albo | ⊙* | — weiß | ¾ | 1½ | ½ |
| 1003 | — | — fl. carneo | ⊙* | fleischfarbige | 2 | 3 | ½ |
| 1004 | — | — **fl. pl.** | ⊙ | prachtvolle gefüllte Clarkie, neu. (Obgleich der Same nur von gefüllt blühenden Pflanzen gesammelt, werden doch noch etwas einfach blühende daraus fallen.) | 6 | 8 | 1 |
| 1005 | — | — integripetala | ⊙ | ganzrandige rothe | 1 | 1½ | ½ |
| 1006 | — | — — alba | ⊙ | rein weiße | 3 | 4 | 1 |
| 1007 | — | — — **nana** | ⊙* | neu, sehr schöne und constante Zwerg- | 2 | 3 | ½ |
| 1008 | — | — lillacina grandiflora | ⊙ | großblumige lillafarbige | 1/3 | 2 | ½ |
| 1009 | — | — marginata | ⊙ | weißgeränderte Varietät | 1/3 | 2 | ½ |
| 1010a | — | **pulcherrima** | ⊙ | rein brillant carmin, die schönste der Clarkien | 1 | 1½ | ½ |
| 1010b | — | pulchella | ⊙ | in vorstehenden Farben gemischt | 1 | 1½ | ½ |
| 1011 | Cleome | speciosissima | *mt* | schönste Cleome, für Gruppen | — | 8 | 1 |
| 1013 | Clianthus | Dampieri | ♄*E* | Dampier's, prachtvolle Species à 100 K. 3⅓ Rk. à 50 K. 55 Sgr. à 25 K. 30 Sgr. | — | — | 14 |

Diese überaus prachtvolle Pflanze läßt sich am besten als Sommergewächs cultiviren, indem sie im März ausgesäet, schon im Juli ihre prachtvollen Blumen entwickelt. (Bei etwas früherer Aussaat blühete dieselbe in unserm Garten schon Mitte Juni.) Die 3″ langen Blumen sind leuchtend scharlachroth mit tief schwarzem Auge.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 | Clianthus | puniceus | ♄ | prachtvolle Bogenblume à 100 K. Sgr. | — | — | — |
| 1015 | Clintonia | elegans | *m* | zierliche | — | 12 | 1 |
| 1016 | — | pulchella | *mt* | ausgezeichnet zierliche | — | 25 | 1½ |
| 1017 | — | — alba | *mt* | rein weiße | — | 40 | 2 |
| 1018 | — | — atrocinerea | *mt* | röthliche, prachtvoll | — | 25 | 1½ |
| 1019 | **Cobaea** | **scandens** | ♃§*t* | steigende Cobäe, eine der schönsten Schlingpflanzen | 18 | 20 | 1½ |
| 1020 | Codonopsis | lurida | §♃ | gelblich bleifarben | — | 15 | 1 |
| 1021 | **Collinsia** | bartsiaefolia | ⊙* | bartsienblättrige | 2 | 3 | ½ |
| 1022 | — | — fl. albo | ⊙* | weißblühende | — | — | 1 |
| 1023 | — | **bicolor** candidissima | ⊙* | schneeweiße | 2 | 3 | ½ |
| 1024 | — | — fl. albo | ⊙* | weiße | 1 | 1½ | ½ |
| 1025 | — | — fl. carneo | ⊙* | fleischfarbene | 2/3 | 1 | ½ |
| 1026 | — | — **major** | ⊙* | schöne zweifarbige, **sehr beliebte Sorte** | 2/3 | 1 | ½ |
| 1028 | — | **grandiflora** | ⊙* | niedliche blaue, sehr beliebt | 1 | 1½ | ½ |
| 1029 | — | **multicolor** | ⊙* | schönste vielfarbige | ¾ | 1½ | ½ |
| 1030 | — | — marmorata | ⊙* | weiß mit rosa marmorirt | ¾ | 1½ | ½ |
| 1031 | — | | ⊙* | in schöner Melange | ¾ | 1 | ½ |
| 1032 | Collomia | coccinea | ⊙ | scharlachrothe Collomie | 2/3 | 1 | ½ |
| 1033 | Commelina | coelestis | *m* | himmelblaue Commeline | 5 | 6 | 1 |
| 1034 | — | — alba | *m* | weiße | 5 | 6 | 1 |
| 1035 | — | — variegata | *m* | gestreifte | 5 | 6 | 1 |
| 1036 | Convolvulus | bicolor | ⊙* | zweifarbige kriechende Winde | ¼ | 1 | ½ |
| 1037 | — | tricolor | ⊙* | dreifarbige — — | ¼ | 1 | ½ |
| 1038 | — | — albus | ⊙* | weiße — — | ¼ | 1 | ½ |
| 1039a | — | — azureus (newdark) | ⊙* | tief dunkelblau (variirt) | ¼ | 1 | ½ |
| 1039b | — | — **monstrosus** | ⊙* | neu, eine sehr schöne, tief dunkelblaue, fast ganz constante Sorte | 1/3 | 2 | ½ |
| 1040 | — | — **splendens** | ⊙* | in drei prachtvollen Farben, lillaroth, violettroth und tief indigoblau mit großem hellem Centrum | 2/3 | 1 | ½ |
| 1041 | — | — variegatus | ⊙* | weiß mit blau gestreift | 1/3 | 1 | ½ |
| 1042 | — | | ⊙* | in schöner Melange | ¼ | 1 | ½ |
| 1043 | Cosmanthus | fimbriatus | *m* | gefranzte Schmuckblume (keimt langsam aber sicher, wenn der Same regelmäßig feucht gehalten wird) | — | 5 | 1 |
| 1044 | Cosmea | bipinnata | *m* | doppelt gefiederte Cosmee | 2/3 | 4 | 1 |
| 1045 | — | — purpurea | *m* | purpurrothe | 2/3 | 4 | 1 |
| 1046 | Cosmidium | Buridgianum | *m* | sammtartig dunkelbraun, goldgelb umsäumt | 1/3 | 2 | ½ |
| 1047 | — | filiforme | *m* | gelbblühende, aus Texas | — | 8 | 1 |
| 1048 | Cotula | coronopifolia | ⊙ | kleine gelbe krähenfußblättrige Laugenblume | — | 5 | 1 |
| 1049 | Crepis | alba (Barkhausia) | ⊙ | weißer Pippau | ½ | 2 | ½ |
| 1050 | — | barbata (Tolpis) | ⊙ | gelber bärtiger | ½ | 2 | ½ |
| 1051 | — | Drummondii | *m* | Drummond's | 2 | 3 | ½ |
| 1052 | — | rubra | ⊙ | rother Pippau | ½ | 2 | ½ |
| 1053 | Crucianella | stylosa | ♃*E* | langgriffeliges Kreuzblatt | 3 | 4 | 1 |
| 1054 | Cucumis | anguineus | *w* | schlangenfrüchtige Gurke | — | 5 | 1 |
| 1055 | — | dipsaceus | *w* | kardenfrüchtige Gurke | — | 4 | 1 |
| 1056 | — | Dudaim (odoratissimus) | *w* | stark duftende kleinfrüchtige | — | 5 | 1 |
| 1057 | — | perennis | ♃§*t* | perennirende, rankende Blattpfl. à 100 K. 4 Sgr. | — | — | 1½ |
| 1058 | Cucurbita | leucantha | ⊙ | Zier-Kürbis mit weißen Blüthen, stark kletternd und besonders schön zur Deckung von Wänden, Lauben ꝛc., in 6 Sorten à | — | 5 | 1 |
| 1059 | — | — longissima | ⊙ | 6′ lange Herkuleskeule, schön zur Bedeckung von Wänden | 2 | 3 | ½ |
| 1060 | Cuphea | miniata | ♄*mt* | prächtige dunkelrothe Cuphea à 1000 K. Sgr. | 12 | 15 | 1 |
| 1061 | — | ocymoides | *t* | purpurviolette, neu à 1000 K. Sgr. | — | 40 | 2 |
| 1062 | — | platycentra | ♄*mt* | hochrothe prachtvolle, blühet fortwährend, für Gruppen, 1′ hoch | — | 90 | 4 |
| 1063 | — | purpurea | *m* | in mehreren Nüancen | — | 10 | 1 |
| 1064 | — | silenoides | ⊙ | silenenartige schwarzbraune. (Der Same wird Anfang April in's freie Land gesäet, wo er dann Mitte Mai aufgeht.) | 5 | 6 | 1 |
| 1065 | — | strigulosa | ♄*mt* | gelblichrothe, gestriegelte à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 5 |
| 1066 | — | Zimapanii | *m*! | neu, sehr großblumig, 4′ hoch | — | 12 | 1 |
| 1067 | Cupressus | pyramidalis | ♄ | pyramidenförmige | ½ | 1 | ½ |
| 1068 | — | sempervirens | ♄ | immergrüne, aufrechte | ½ | 1 | ½ |
| 1069 | Cyclanthera | explodens (elastica) | *m*§ | neu, sehr interessant, indem die Früchte stark explodiren, von sehr schöner schnell wachsender Belaubung | — | 15 | 1 |
| 1070 | — | pedata | ⊙§ | hochrankende | 2 | 3 | ½ |
| 1071 | Cynoglossum | coelestinum | ♂*E* | himmelblaues Vergißmeinnicht | 1/3 | 2 | ½ |
| 1072 | — | **linifolium** (Omphalodes lin.) | ⊙* | weißes Vergißmeinnicht, sehr beliebt zu Einfassungen | 2/3 | 1 | ½ |
| 1073 | Datura | ceratocaulis | ⊙ | wohlriechender, sehr großblühender Stechapfel, sehr schön | 3 | 4 | 1 |
| 1074 | — | humilis flava fl. pl. | *w* | mit niedrigem Habitus und großen halbgefüllten Blumen | 4 | 5 | 1 |
| 1075 | — | fastuosa alba pl. | *mtw* | gefüllter weißer | 2 | 3 | 1 |
| 1076 | — | — violacea pl. | *mtw* | — violetter | 2 | 3 | 1 |
| 1077 | — | Metel | *m* | weißer | 2 | 3 | 1 |
| 1078 | — | Wrightii (Meteloides) | *m* | weißlichlilla mit Atlasglanz | 2 | 3 | 1 |
| 1079 | Daubentonia | magnifica | ♄ | prächtige à 100 K. 16 Sgr. | — | — | 3 |
| 1080 | — | punicea | ♄ | granatrothe à 100 K. 12 Sgr. | — | — | 2½ |

| №. | | | | à Rt. | Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | Daubentonia Tripetiana | ♄ | hübsche Schmetterlingsblume à 100 K. 8 Sgr. | — | 25 | 2 |
| 1084 | Delphinium cardiopetalum | ⊙ | sehr vollblühend, violett | 2 | 3 | ½ |
| 1085 | — elatum | 4 | hohe | 2 | 3 | ½ |
| 1086 | — **formosum** | 4 E | prachtvolle hellblaue constante Sorte | 2 | 3 | ½ |
| 1087 | — grandiflorum (chinense) | 4 E | großblumige chinesische in diversen Nüancen | 2½ | 4 | 1 |
| 1088 | — — fl. albo | 4 E | rein weiß | 5 | 6 | 1 |
| 1091 | — perenne | 4 | neueste Prachtsorten gemischt | 3 | 4 | 1 |
| | — | ⊙ | die übrigen Rittersporn siehe Sortimente. | | | |
| 1092 | Dianthus atrococcineus | ♂ | schöne dunkelscharlachrothe Nelke | 7 | 8 | 1 |
| 1093 | — barbatus | ♂ | Bartnelken in vielen Nüancen | 1½ | 2 | ½ |
| 1094 | — — **fl. pl.** | ♂ | neue gefüllte Varietäten, (liefern aus Samen etwas einfache) | 8 | 10 | 1 |
| 1095 | — — **Dunnetti** | 4 | leuchtend blutroth | — | 12 | 1 |
| 1096 | — — **oculatus marginatus** | 4 | mit weißem Auge und weiß gerändert, in prächtigen Nüancen | — | 12 | 1 |
| 1097 | — **caryophyllus fl. pl.** | ♂ | Topf-Chor-Nelken **1. Ranges**, das ganze Sortiment gemischt à 1000 K. 3½ Rt. à 100 K. 12 Sgr. | — | — | 12 |

Von Topf-Chor-Nelken cultiviren wir mehr als 4000 Töpfe in circa 400 der vorzüglichsten Sorten.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Dianthus caryophyllus fl. pl. | ♂ | Topf-Chor-Nelken 2. Ranges à 1000 K. 1⅓ Rt. à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 5 |
| 1102 | — — — | ♂ | **bunte gefüllte** Gartennelken, **1. Qualität** | — | 22 | 1½ |
| 1103 | — — — | ♂ | einfarbige **gefüllte** Gartennelken | 10 | 12 | 1 |
| 1104 | — — — | ♂ | frühblühende **gefüllte**, meist einfarbige | 12 | 14 | 1 |
| 1105 | — — nanus fl. pl. | 4 | niedrige, frühblühende **gefüllte**, meist einfarbige | — | 16 | 1½ |
| 1106 | — — **semperflorens fl. pl.** | ♂ | (Remontant) 1. Ranges à 1000 K. 2 Rt. à 100 K. 8 Sgr. | — | — | 8 |
| 1107 | — — — - | ♂ | (Remontant) 2. Ranges à 1000 K. 10 Sgr. | — | 40 | 2 |
| 1108 | — **chinensis fl. pl.** | ⊙* | prächtige gefüllte Chinesernelke in vielen Nüancen, extra | 2⅔ | 4 | 1 |
| 1109 | — — fl. albo pl. | ⊙* | gefüllte weiße | — | 8 | 1 |
| 1110 | — — — striato pl. | ⊙* | — — mit violettroth gestreift | — | 8 | 1 |
| 1111 | — — — rubro — pl. | ⊙* | rothgestreifte gefüllte | — | 8 | 1 |
| 1112 | — — pumila nova species | ⊙* | ganz niedrige Zwerg-, halbgefüllte neueste Prachtsorten | — | 12 | 1 |
| 1113 | — — **imperialis fl. pl.** | ⊙* | großblumige gefüllte Kaiser-Nelke, prachtvolle Nüancen, extra | 2⅔ | 4 | 1 |
| 1114 | — — — **compactus fl. pl.** *m* | | prachtvoll und neu. Diese Varietät ist niedriger und bei starker Verzweigung sehr compact gebaut | 3⅓ | 4 | 1 |
| 1116 | — — — fl. atrosang. pl. | ⊙* | extra gefüllte dunkelblutrothe | 6 | 8 | 1 |
| 1118 | — — **Heddewigii** (giganteus) *m* | | (Heddewig.) Diese prachtvolle Nelke hat sich bei uns nicht nur im Bau und in Form rein erhalten, sondern auch im Farbenspiel verbessert, in den meisten Gärtnereien ist sie dahingegen verbastardet | 10 | 12 | 1 |
| 1119 | — — — **hybrid. fl. pl.** (Dippe) *m* | | prachtvoll und neu. Wir haben diese Hybride durch Befruchtung der **D. Heddewigii** mit andern Sorten gezogen, dieselbe liefert 75 % schön gefüllte Stöcke in den mannigfaltigsten Farben. Die Pflanze hat einen schönen buschigen Habitus, ist sehr reichblühend und cultivirt sich so leicht, als **D. chinensis** fl. pl. | 10 | 12 | 1 |
| 1121 | — — laciniatus *m* | | (Heddewig) tiefgefiederte Riesennelke, einfach blühend, aber sehr schön gezeichnete Varietät | 7 | 8 | 1 |
| 1122 | — — — — fl. pl. *m* | | nur von gefüllten Blumen gesammelt, macht wenig Effect à 1000 K. 8 Sgr. | — | 30 | 2 |
| 1125 | — — nanus fl. **atrosanguineo** pl. *m* | | dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön | — | 15 | 1 |
| 1126 | — — — — fl. cupreo pl. *m* | | kupferfarbene Zwerg- | — | 15 | 1 |
| 1127 | — — — — fl. roseo pl. *m* | | prächtige rosenrothe à 10,000 K. 2 Rt. à 1000 K. 8 Sgr. | — | 30 | 2 |
| 1128 | — Gardnerianus | *m* | gefranzte Varietät | 4 | 5 | 1 |
| 1129 | — plumarius | ♂* | schön gezeichnete Federnelken | 2 | 3 | ½ |
| 1130 | — — **fl. pl.** | 4* | Federnelke, von nur extra gefüllten Blumen à 1000 K. 45 Sgr. à 100 K. 6 Sgr. | — | — | 6 |
| 1132 | — superbus grandiflorus | ♂ | großblühende gefranzte | — | 10 | 1 |
| 1133 | Digitalis Buxbaumii | 4 | niedriger Fingerhut | — | 10 | 1 |
| 1134 | — ferruginea gigantea | 4 | rostfarbiger 7—8′ hoher Riesen- | 5 | 6 | 1 |
| 1135 | — grandiflora | ♂ | großblumiger gelber | — | — | 1 |
| 1136 | — lanata | 4 | wolliger, hübscher | — | 4 | 1 |
| 1137 | — purpurea | ♂ | purpurrother | 2½ | 4 | 1 |
| 1138 | — — fl. albo | ♂ | weißer | — | 4 | 1 |
| 1141 | Dolichos altissimus (giganteus) | *tm*§ | purpurblühend, sehr hochwachsende Faselbohne | — | 5 | 1 |
| 1142 | — Lablab | *m*§ | röthliche | — | 3 | 1 |
| 1143 | — lignosus | 4*t* | holzige | — | 5 | 1 |
| 1144 | Dracocephalum altaiense | 4 | prachtvoll lasurblau | — | 12 | 1 |
| 1145 | — argunense | 4 | sehr schön hellblau | — | 12 | 1 |
| 1147 | — mexicanum | ♄*m* | rothblühende mexicanische Cedronelle, für Herbstflor sehr schön | — | 40 | 2 |
| 1148 | — moldavicum | *m* | blauer Drachenkopf | ⅔ | 1 | ½ |
| 1149 | — — fl. albo | *m* | weißer — | ⅔ | 1 | ½ |
| 1150 | — Ruyschianum | 4 | schwedischer, schön himmelblau | — | 8 | 1 |
| 1151 | — virginianum | 4 | hellpurpur, sehr hübsch. Die Blumen lassen sich beliebig drehen | — | 8 | 1 |
| 1152 | Erodium gruinum | *m* | canadischer Reiherschnabel (der Same dient als Wetteranzeiger) | 3 | 4 | 1 |
| 1154 | Eryngium planum | 4 | hübsche blaue Alpenmannstreu | 2 | 3 | ½ |
| 1155 | Erysimum arkansanum | *m* | schwefelgelber, großdoldiger Hederich | 2½ | 4 | 1 |
| 1156 | — Perowskianum | ⊙ | leuchtend orangefarbener | ¾ | 1½ | ½ |
| 1157 | Erythrina crista galli | ♄*t* | prachtvoller Korallenbaum à 100 K. 18 Sgr. | 6½ | 8 | 3 |
| 1158 | — Hendersonii | ♄*t* | Henderson's à 100 K. 2 Rt. | — | — | 6 |
| 1159 | — laurifolia | ♄*t* | lorbeerblättrige, schön à 100 K. 30 Sgr. | — | — | 4 |
| 1160 | Eschscholtzia alba | ⊙ | weiße | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1161 | — californica | ⊙ | californische | 1 | 1½ | ½ |
| 1162 | — crocea | ⊙ | safrangelbe, schön | 1 | 1½ | ½ |
| 1163 | — tenuifolia | ⊙ | klein- und vielblumige | 3 | 4 | 1 |
| 1164 | Ethulia corymbosa | *m* | traubenblüthige, lilla, schön | — | 12 | 1 |
| 1165 | Eucharidium grandiflorum | ⊙ | rothblühend, großblumig | 1½ | 2 | ½ |
| 1166 | — — album | ⊙ | weißblühend | 4 | 5 | 1 |
| 1167 | — — roseum | ⊙ | hellrosa, sehr schön | 4 | 5 | 1 |
| 1168 | Eucnide bartonioides | ⊙*tw* | bartonienartige Eucnide für Töpfe, reiner Samen | — | 50 | 2½ |
| 1169 | Eupatorium Fraserii | 4 E | großdoldiger, weißer carolinischer Dosten | — | 10 | 1 |
| 1171 | Eutoca viscida | ⊙ | hübsche blaue | 1½ | 2 | ½ |
| 1172 | — — albida | ⊙ | weißliche Varietät | — | 3 | ½ |
| 1173 | — Wrangeliana | ⊙ | Wrangel's | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1174 | Fenzlia dianthiflora | ⊙*t* | liebliches, rosalillafarbiges Sommergewächs à 1000 K. 10 Sgr. | — | — | 5 |
| 1176 | Gaillardia bicolor | 4 E | zweifarbige | 4 | 5 | 1 |
| 1177 | — **picta** | *m* | roth mit gelber Einfassung, schön | 2 | 3 | ½ |
| 1178 | — — marginata | *m* | weißgerandete prächtige | 3 | 4 | 1 |
| 1179 | — Josephus | *m* | prächtige großblumige (variirt) | — | — | 1 |
| 1181 | Galega orientalis | 4 | morgenländische Geisraute | — | 8 | 1 |
| 1182 | Gamolepis Tagetes | ⊙ | leuchtend gelbe | 3 | 4 | 1 |
| 1183 | Gaura Lindheimeri | 4 E | Lindheimer's Prachtkerze | — | 5 | 1 |
| 1184 | Gentiana acaulis | 4* | stengelloser Enzian (liebt schweren Boden) | — | 25 | 1½ |
| 1185 | Georgina variabilis fl. pl. | 4 E | Georginen, nur von den vorzüglichsten Prachtsorten à 100 K. 8 Sgr. | — | 60 | 4 |
| 1186 | — — fl. pl. | 4 E | von hübschen gefüllten Blumen gesammelt | 10 | 12 | 1 |
| 1187 | — — fl. pl. | 4 E | Liliput à 100 K. 12 Sgr. | — | 90 | 5 |
| 1188 | Geum chiloense | 4 | rothe chilische, sehr schön | — | 8 | 1 |
| 1189 | Gilia achilleaefolia | ⊙ | schafgarbenblättrige Gilie | ⅓ | 1 | ½ |
| 1190 | — capitata | ⊙ | blaue kopfförmige | ⅓ | 1½ | ½ |
| 1191 | — — fl. albo | ⊙ | weißliche — | ⅓ | 1½ | ½ |
| 1192 | — nivalis | ⊙ | weiße | ⅓ | 1½ | ½ |
| 1193 | — species de Californica | ⊙ | hübsche Species | ⅓ | 1½ | ½ |
| 1194 | — **tricolor** | ⊙ | dreifarbige, sehr beliebte Sorte | ⅔ | 1 | ½ |
| 1195 | — — fl. albo | ⊙ | weiße | ⅔ | 1 | ½ |
| 1196 | — — fl. roseo | ⊙ | röthliche | ⅔ | 1 | ½ |
| 1197 | — | ⊙ | alle Sorten gemischt | ⅔ | 1 | ½ |
| 1198 | Glaucium luteum | 4 | gelber Hornmohn | 2 | 3 | ½ |
| 1199 | — phöniceum | 4 | rother — | 2 | 3 | ½ |
| 1201a | **Gloxinia hybrida** | *tw* | **I. Ranges**, von ganz vorzüglichen Sorten gesammelt à Pr. von über 1000 K. 5 Sgr. 50 Pr. 6 Rt. à 1/10 Lth. | — | 60 | 6 |
| 1201b | — — | *tw* | II. Ranges à 1/10 Lth. | — | 25 | 4 |
| 1202 | — — **erecta** | *tw* | Gloxinien mit aufrechtstehenden Blumen von den neuesten und besten Sorten 1. Ranges à Pr. von über 1000 K. 6 Sgr. 50 Pr. 7 Rt. à 1/10 Lth. | — | — | 8 |

Die Gloxinien haben wir durch sorgfältige Cultur sehr verbessert und können solche mit Recht empfehlen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 | Gnaphalium foetidum | *m* | starkriechende Strohblume | — | 8 | 1 |
| 1204 | Godetia amoena | ⊙ | angenehme hübsche Godetie | 1 | 1½ | ½ |
| 1205 | — — fl. albo | ⊙ | weißblühende | 1 | 1½ | ½ |
| 1206 | — lepida | ⊙ | kleinblumige | 1 | 1½ | ½ |
| 1207 | — Lindleyana | ⊙ | Lindley's prachtvolle | 1 | 1½ | ½ |
| 1208 | — tenella | ⊙ | zarte violette | 1 | 1½ | ½ |
| 1209 | — **„the Bride"** | ⊙ | neu, prachtvoll. Die Blumen sind von weißlicher Färbung mit einem schmalen carminrothen Ringe an der Basis der Corolle. Sehr großblumig und reichblühend | 4 | 5 | 1 |
| 1210 | — venosa | ⊙ | rothgeaderte | 1 | 1½ | ½ |
| 1211 | — | ⊙ | in bester Melange | 1 | 1½ | ½ |
| 1212 | Gomphrena globosa fl. albo | *mt* | weißer Kugelamaranth | 2 | 3 | ½ |
| 1213 | — — fl. carneo | *mt* | fleischfarbiger — | 2 | 3 | ½ |
| 1214 | — — fl. purpureo | *mt* | purpurrother — | 2 | 3 | ½ |
| 1215 | — — fl. variegato | *mt* | bunter — | 2 | 3 | ½ |
| 1216 | — sp. aurantiaca (Haageana) | *mt* | dunkelorangefarbig | 2½ | 4 | 1 |
| 1217 | — | *mt* | alle Sorten gemischt | 2 | 3 | ½ |
| 1218 | Grahamia aromatica | ⊙ | gewürzhafte Grahamie | — | 4 | 1 |
| 1219 | Grammanthes gentianoides | *mtw* | enzianartige Schriftblume, scharlach mit goldgelb, Crassulacee, für Töpfe sehr zierlich | — | 75 | 3 |
| 1220 | Gypsophila elegans | ⊙ | zierliches Gypskraut, für Gruppen und zu Bouquets sehr schön | ½ | 1 | ½ |
| 1221 | — — fl. roseo | ⊙ | rosa, desgl. | ½ | 1 | ½ |
| 1222 | — muralis | *m** | zierlich und reichblühend | 3 | 4 | 1 |
| 1223 | — paniculata | 4 | rispenblüthig, sehr schön zu Bouquets | 2 | 3 | ½ |
| 1225 | Hebenstreitia dentata | *m* | gezähnte | — | 6 | 1 |
| 1226 | — erinoides | *m* | zarte weiße, wohlriechend | — | 6 | 1 |
| 1227 | Hedysarum coronarium | ♂*t* | purpurrother schöner Hahnenkopfklee | 1 | 1½ | ½ |
| 1228 | — — fl. albo | ♂*t* | weißer | 1½ | 2 | ½ |
| 1229 | — elongatum | 4 | verlängerter | — | 2 | ½ |
| 1231 | Helenium Douglasii | ⊙ | Douglasen's Helenie | 2½ | 4 | 1 |
| 1232 | — tenuifolium | *m* | feinblättrige, aus Texas | 3 | 4 | 1 |
| 1233 | Helianthemum mutabile | 4 E | Sonnenröschen, schöne Nüancen | — | 4 | 1 |
| 1234 | Helianthus annuus fl. pl. | ⊙ | gefüllte Sonnenblume | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1235 | — — giganteus | ⊙ | echte Riesen-Sonnenblume von colossaler Höhe und Größe | 1½ | 2 | ½ |
| 1236 | — argyrophyllus | *m* | silberblättrige 6′ hohe | 2 | 3 | ½ |
| 1237 | — — striatiflorus fl. pl. | ⊙ | neu, zuweilen leicht gestreift | — | 6 | 1 |
| 1239 | — **californicus** (var. centrochlorus) **fl. pl.** | ⊙ | dichtgefüllte 4′ hohe hochgelbe Sonnenblume, unstreitig die empfehlenswertheste Sorte | 2⅓ | 3 | 1 |
| 1241 | — nanus fl. pl. | ⊙ | gefüllte Zwerg- | 3 | 4 | 1 |
| 1242 | Helichrysum bracteatum album | *m* | gewöhnliche weiße | 2 | 3 | ½ |
| 1243 | — — aureum | *m* | gewöhnliche gelbe | 2 | 3 | ½ |
| 1244 | — — nanum fl. albo | *m* | weiße Zwerg- | — | 6 | 1 |
| 1245 | — — — fl. luteo | *m* | gelbe Zwerg- | — | 6 | 1 |
| 1246 | — — **monstrosum** | *m* | größtgefüllte Strohblume in folgenden Farben gemischt | 10 | 12 | 1 |
| 1247 | — — — **fl. albo pl.** | *m* | rein weiße | — | 15 | 1 |
| 1248 | — — — **fl. bruneo pl.** | *m* | prachtvolle orangescharlach u. dunkelbraunrothe Nüancen | — | 15 | 1 |
| 1249 | — — — **fl. luteo pl.** | *m* | rein gelbe | — | 15 | 1 |
| 1250 | — — — **fl. roseo pl.** | *m* | rosenrothe | — | 15 | 1 |
| 1251 | — — — **fl. purpureo pl.** | *m* | prachtvolle carmoisin und purpurrothe Nüancen | — | 15 | 1 |
| 1252 | — — — **Borussorum rex** | *m* | Diese Sorte ist rein weiß, fast ganz constant und sehr regelmäßig gebaut, **extra** | — | 15 | 1 |

Unsere Helichrysum monstrosum sind alljährlich verbessert, weshalb wir solche jedem Blumenfreunde als etwas ganz Ausgezeichnetes empfehlen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1253 | Helichrysum br. monstromum nanum fl. pl. | *m* | gefüllte Zwerg- gemischt | — | 15 | 1 |
| 1254 | — — — nanum fl. albo pl. | *m* | weiße | — | 18 | 1½ |
| 1255 | — — — — fl. fuscato pl. | *m* | bräunliche | — | 18 | 1½ |
| 1256 | — — — — fl. luteo pl. | *m* | gelbe | — | 18 | 1½ |
| 1257 | — — — — fl. roseo pl. | *m* | rosenrothe | — | 18 | 1½ |

| № | | | | | à Lb. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1258 | Helichrysum brachyrrhynchum | ⊙ | *m* | (Waitzia), prächtige Strohblume | 6 | 8 | 1 |
| 1259 | — capitatum (flavissimum) | ♄ | *mt* | kopfförmige gelbe Immortelle | — | 10 | 1 |
| 1260 | — elegans | ♄ | *m* | unter dem falschen Namen **Morna** elegans bekannt, wie vorstehende, nur niedriger und mit kleineren Blättern | — | 12 | 1 |
| 1261 | — strictum | ♄ | *m* | (Chrysocephalum strict.), orangenfarbige Immortelle, immerblühend, ähnlich wie capitatum | — | 10 | 1 |
| 1262 | Heliophila araboides | | *m* | arabische himmelblaue Sonnenwende | — | 5 | 1 |
| 1263 | — dissecta | | *m* | blaue, schön | — | 8 | 1 |
| 1264 | Heliotropium Triomphe de Liège | ♄ | *t* | großblumige, lilla | — | 15 | 1½ |
| 1265 | — Voltaireanum | ♄ | *t* | prächtige dunkelblaue | — | 18 | 1½ |
| 1267 | Heracleum giganteum | 4 | | Riesen-Blattpflanze | 3 | 4 | 1 |
| 1268 | — Wilhelmsii | 4 | | Wilhelm's | — | 5 | 1 |
| 1269 | Hesperis matronalis | ♂ | | Mutterviole, violette | — | 4 | 1 |
| 1270 | — — fl. albo | ♂ | | weiße | — | — | 1 |
| 1271 | — **tristis** | ♂ | | wohlriechende, wahre Nachtviole | — | — | 1 |
| 1272 | Hibiscus calisurus | ⊙ | | sehr großblumig, gelb mit schwarzem Auge | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1273 | Hieracium aurantiacum | 4 | | orangenrothe, hübsch | — | 10 | 1 |
| 1274 | Holcus saccharatus | ⊙ | | Zuckerrohr, hübsche Blattgruppenpflanze, auch als Grünfutterpflanze sehr empfohlen | ⅙ | 1 | ½ |
| 1275 | **Humea elegans** | ♂ | *t* | schöne Humea, für Bouquets und für Gruppen auf Rasen sehr schön | — | 40 | 2 |
| 1276 | Hunnemannia fumariaefolia | 4 | *t* | Eschscholtzien ähnliche Blumen, sehr schön | — | 15 | 1 |
| 1277 | Hymenoxis californica | ⊙ | | californische Hymenoxis | — | 6 | 1 |
| 1278 | Iberis amara | ⊙ | * | weiße Schleifenblume | 1 | 1½ | ½ |
| 1279 | — odorata | ⊙ | * | wohlriechende weiße | 1 | 1½ | ½ |
| 1280 | — Tenoreana | ♂ | * | lillafarbene, 3″ hohe allerliebste Frühlingsblume | — | 22 | 1½ |
| 1281 | — **umbellata** | ⊙ | * | violette doldentragende | 1 | 1½ | ½ |
| 1282 | — — **carnea** | ⊙ | * | fleischfarbene, neu | 5 | 6 | 1 |
| 1283 | — — **purpurea** | ⊙ | * | purpurrothe | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1284 | — — — **Dunnetti** | ⊙ | * | Dunnett's allerdunkelste dunkelpurrothe, sehr echt | 1⅓ | 2 | ½ |
| | **Balsaminen** | | *tm* | siehe Sortimente. | | | |
| 1289 | Indigofera coccinea | ♄ | | scharlachrothe à 100 K. 6 *Sgr.* | — | — | 3 |
| 1290 | — dosua | ♄ | | aus Ostindien, im Freien ausdauernd | — | 8 | 1 |
| 1291 | Ipomoea bona nox | | *mt*§ | stachlichte Trichterwinde | 1½ | 2 | ½ |
| 1292 | — coccinea | | *m*§ | scharlachrothe kleinblumige | 1½ | 2 | ½ |
| 1293 | — — fl. luteo | | *m*§ | gelbe | 2 | 3 | 1 |
| 1294 | — ficifolia | | *mt*§ | feigenblättrige à 100 K. 5 *Sgr.* | — | — | 1½ |
| 1295 | — hederacea atroviolacea | | *m*§ | dunkelviolette, weiß umsäumt | 3 | 4 | 1 |
| 1296 | — — lillacina | | *m*§ | prächtig lilla, weiß umsäumt, extra | 3 | 4 | 1 |
| 1297 | — — superba grandiflora | | *m*§ | großblumig, himmelblau mit weißem Rande | — | 5 | 1 |
| 1298 | — — — — **alba** | | *m*§ | weiß, großblumig, atlasglänzend | — | 5 | 1 |
| 1299 | — Learii | | *t*§*w* | Lear's à 100 K. 18 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 1300 | — limbata (Pharbitis) | ⊙ | *wt*§ | prachtvolle purpurne mit hellem Rande | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1301 | — — elegantissima | ⊙ | *wt*§ | prächtige Varietät der vorstehenden | 4 | 5 | 1 |
| 1302 | — mexicana grandiflora | ⊙ | *wt*§ | hübsche großbl. Species (mit sehr großem Korn) à 100 K. 18 *Sgr.* | 4 | 5 | 2½ |
| 1303 | — Nil (Pharbitis Nil) | ⊙ | *w*§ | hellblau | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1304 | — — grandiflora | ⊙ | *w*§ | (Ferandiana) großbl. hellblaue | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1305 | — **purpurea** (Pharbitis hispida) | ⊙ | § | hochwachsende Winde, für's freie Land die geeignetste, in folgenden Farben gemischt | ¾ | 1½ | ½ |
| 1306 | — — | ⊙ | § | dunkelblau | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1307 | — — | ⊙ | § | hellincarnatroth | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1308 | — — | ⊙ | § | lilla | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1309 | — — | ⊙ | § | rein weiß | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1310 | — — | ⊙ | § | rosa | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1311 | — — | ⊙ | § | weiß mit blau gestreift | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1312 | — — | ⊙ | § | weiß mit 5 violetten Streifen | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1313 | — — | ⊙ | § | weiß mit rosa Schlund | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1314 | — — **atrosanguinea** | ⊙ | § | dunkelste | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1315 | — — Michauxii | ⊙ | § | mit rosa gestreift | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1316 | — — spec. de India | ⊙ | § | die schönste dunkelste blaue | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1317 | — — variegata kermes. | ⊙ | § | prachtvollste carminrothe | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1318 | — — tricolor | ⊙ | § | dreifarbige, schön gestreift | 1⅔ | 3 | 1 |
| 1319 | — Quamoclit (vulgaris) | ⊙ | *tw*§ | gefiedertblättrige hochrothe | 3 | 4 | 1 |
| 1320 | — — fl. albo | ⊙ | *tw*§ | weiße | 3 | 4 | 1 |
| 1321 | — — fl. roseo | ⊙ | *tw*§ | rosenrothe | 3 | 4 | 1 |
| 1322 | — Sellovii | | *tw*§ | Sellow's schöne aus Brasilien à 100 K. 10 *Sgr.* | — | — | 2 |
| 1323 | — tyrianthina | | *tw*§ | prachtvoll mit sammtig braunvioletten Blumen à 100 K. 25 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 1324 | — violacea vera | ⊙ | *tw*§ | prachtvoll, großblumig, hellblau à 100 K. 10 *Sgr.* | — | 60 | 2½ |
| 1325 | — — fl. albo | ⊙ | *tw*§ | schöne, rein weiße Varietät à 100 K. 12 *Sgr.* | — | 70 | 3 |
| 1326 | Ipomopsis Beyrichii | ♂ | *t* | gedrängtblühende rothe Ipomopsis | 3 | 4 | 1 |
| 1328 | — elegans (picta) | ♂ | *t* | schöne rothblühende | 3 | 4 | 1 |
| 1329 | — — aurantiaca | ♂ | *t* | orangenfarbige | 3 | 4 | 1 |
| 1330 | — — superba | ♂ | *t* | prächtige von lebhafter Farbe | 3 | 4 | 1 |
| 1331 | — — div. species | ♂ | *t* | Ipomopsis in guter Melange | 3 | 4 | 1 |
| 1332 | Iris hybrida | 4 | | Mischung prachtvoller Hybriden | — | 8 | 1 |
| 1333 | Isotoma axillaris | ♂ | ⊙*t** | winkelständige, blaue, hübsch | — | 12 | 1 |
| 1334 | — petraea | ♂ | ⊙*t** | weiße | — | 12 | 1 |
| 1335 | — — coerulea | ♂ | ⊙*t** | blaue | — | 12 | 1 |
| 1336 | Jonopsidium acaule | ⊙ | *t* | neue zierliche Miniaturpflanze | — | 6 | 1 |
| 1337 | Kaulfussia amelloides (Charicis Nesii) | | *m** | blaue Anmuthsblume | 2 | 3 | ½ |
| 1338 | — — fl. roseo | | *m** | rosafarbene | 2 | 3 | ½ |
| 1339 | Lactuca perennis | 4 | *E* | blaublühender Lattig | — | 15 | 1½ |
| 1340 | Lasthenia californica | ⊙ | | californische rauhe | 2 | 3 | ½ |
| 1341 | — glabrata | ⊙ | | glattblättrige | 2 | 3 | ½ |
| 1342 | Lathyrus azureus | ⊙ | | ½′ hohe hellblaue Platterbse | ¾ | 1½ | ½ |
| 1343 | — Clymenum | ⊙ | | dunkelroth mit weiß | ¾ | 1½ | ½ |
| 1344 | — latifolius | 4 | § | breitblättrige, schön | 3 | 4 | 1 |
| 1345 | — — fl. albo | 4 | § | **rein weiße** | — | 25 | 2 |
| 1346 | — — fl. roseo | 4 | § | hellrosenrothe | 4 | 5 | 1 |
| 1347 | — Lord Anson | ⊙ | | hellblaue | ¾ | 1½ | ½ |
| 1348 | — luteus | ⊙ | | gelbe | — | 2 | ½ |
| 1349 | — nova species | ⊙ | | großblumige purpurrothe | ¾ | 1½ | ½ |
| 1350 | — **odoratus** | ⊙ | | wohlriechende, in folgenden Farben gemischt ... à 100 *Lb.* 20 *Rc.* | 7/10 | 1 | — |
| 1351 | — — | ⊙ | | dunkelroth | 1/3 | 1 | — |
| 1352 | — — | ⊙ | | roth gestreift | 1/3 | 1 | — |
| 1353 | — — | ⊙ | | roth mit weiß | 1/3 | 1 | — |
| 1354 | — — | ⊙ | | schwarzbraun gestreift | 1/3 | 1 | — |
| 1355 | — — | ⊙ | | schwarzpurpur | 1/3 | 1 | — |
| 1356 | — — | ⊙ | | — mit hellblau | 1/3 | 1 | — |
| 1357 | — — | ⊙ | | weiß | 1/3 | 1 | — |
| 1358 | — — Captain Clarke | ⊙ | | weiß mit rosa und bläulich marmorirt | 1/3 | 1 | — |

| № | | | | | à Lb. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | Lathyrus rotundifolius | 4 | § | dunkelrothe hochwachsende (keimt schwer) | 3½ | 5 | 1 |
| 1360 | — speciosus | ⊙ | | violettbraun | 2⅔ | 1½ | ½ |
| 1361 | Lavatera trimestris fl. albo | ⊙ | | weiße Pappelrose für große Grupp. | 3⅔ | 1 | ½ |
| 1362 | — — fl. rubro | ⊙ | | hellrothe — desgl. | 3⅔ | 1 | ½ |
| 1363 | Leptosiphon androsaceus | ⊙ | * | Dünnröhre, mannsschildartige | 1½ | 2 | ½ |
| 1364 | — aureus | | *m** | goldgelbe | 4½ | 6 | 1 |
| 1365 | — densiflorus | ⊙ | * | dichtblüthige | 2 | 3 | ½ |
| 1366 | — — fl. albo | ⊙ | * | weiße | 2 | 3 | ½ |
| 1367 | — **hybridus** | ⊙ | *t** | neu und sehr empfehlenswerth, in den mannigfaltigsten Nüancirungen | — | 15 | 1 |
| 1368 | — — **acajou** | ⊙ | * | mahagonifarben, sehr schön, neu | — | 25 | 1½ |
| 1369 | — luteus | ⊙ | * | gelbe Dünnröhre | 4 | 5 | 1 |
| 1371 | Liatris spicata | 4 | | ährenblüthige Prachtscharte | — | — | 2 |
| 1372 | Limnanthus Douglasii | | *m* | Douglasen's Sumpfblume | — | 2 | ½ |
| 1373 | Linaria alpina | | *m* | Leinkraut, niedriges blaues, sehr schön ... à ⅒ *Lth.* | — | 20 | 5 |
| 1374 | — bipartita alba | ⊙ | | schön | 2 | 3 | ½ |
| 1375 | — — (elegans) lutea | ⊙ | | glänzende gelbe | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1376 | — — splendens | ⊙ | | prächtig dunkelviolett | 2 | 3 | ½ |
| 1377 | — Cymbalaria | 4 | *E* | epheublättriges, für Ampeln, gedeihet auch auf Mauern | — | 20 | 1½ |
| 1378 | — elegans (bipartita) | ⊙ | | buntes, schön | 2 | 3 | ½ |
| 1380 | — Perezii | ⊙ | | gelbblühendes Leinkraut | — | 4 | 1 |
| 1381 | — triornitophora | | *mt* | drei Vögel tragende, violettrothe | — | 10 | 1 |
| 1382 | — — fl. carneo | | *mt* | fleischfarben | — | 10 | 1 |
| 1383 | Lindelofia spectabilis | 4 | *E* | prächtig himmelblau | — | — | 1½ |
| 1385 | Linum flavum | | *t* | sehr schön | — | 28 | 1½ |
| 1386 | — **grandiflorum verum rubrum** | ⊙ | | echt, prächtiger großblumiger dunkelrother Lein | 2 | 3 | 1 |
| | (Den Samen hat man nur nöthig Mitte April in's freie Land in kleine Furchen oder Rillen zu säen, um eines guten Aufganges sicher sein zu können.) | | | | | | |
| 1387 | Linum Lewisii variegatum | 4 | | blau mit weiß gestreift | 5 | 6 | 1 |
| 1388 | — perenne | 4 | | himmelblauer, hübsch | 2 | 3 | 1 |
| 1389 | — — fl. albo | 4 | | rein weißer | — | 5 | 1 |
| 1390 | Loasa Herbertii | | *m* | Herbert's großblühende | — | 8 | 1 |
| 1391 | — tricolor | | *m* | dreifarbige, brennende | 1½ | 2 | ½ |
| 1392 | Lobelia erinoides | | *mt* | blaue schmalstielige, sehr zierlich | 4 | 5 | 1 |
| 1394 | — — fl. roseo | | *mt* | rosafarbige | 3 | 4 | 1 |
| 1395 | — erinus gracilis alba | | *mt* | neue weißliche | — | 6 | 1 |
| 1396 | — — — coelestina | | *mt* | himmelblau mit weiß, neu und schön | 3 | 4 | 1 |
| 1397 | — — — **erecta** | ⊙ | *m* | prachtvolle, mit gedrängtem Bau, überaus reichblühend, für Topf- wie Land-Cultur, zarte Einfassungen ꝛc. | — | 15 | 1½ |
| 1399 | — — **compacta alba** | | | neu, sehr schön weißblühende | — | 10 | 1 |
| 1400 | — — **hybrida grandiflora** | | *m** | blaublühend, großblumige | 6 | 8 | 1 |
| 1401 | — — Lindleyana (gracilis rosea) | | *mt* | rosa | 3 | 4 | 1 |
| 1402 | — — var. marmorata | | *mt** | innen weiß marmorirt und so großblumig wie vorstehende, prachtvoll | 4 | 5 | 1 |
| 1403 | — — ramosoides | | *mt* | reichblühende Varietät | 4 | 5 | 1 |
| 1404 | — — **speciosa** | | *mt** | Neuheit, die allerschönste, tief dunkelblau, constant à 1000 K. 2½ *Sgr.* | — | 40 | 2 |
| 1405 | — — | | *m***t* | in schöner Melange | 2 | 3 | 1 |
| 1406 | — fulgens multiflora | 4 | *t* | prachtvoll scharlachrothe, reichblühende Varietät à 1000 K. 10 *Sgr.* | — | — | 6 |
| 1408 | — ramosa | | *mt* | ästige, blüthenreiche | — | 14 | 1 |
| 1409 | — — fl. albo | | *mt* | rein weiße | — | 16 | 1½ |
| 1410 | — — fl. roseo | | *mt* | rosenrothe | — | 14 | 1 |
| 1411 | — trigonicaulis | | *mt* | neue Species à 1000 K. 5 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 1412 | — triquetra | | *mt* | vom Cap | — | 8 | 1 |
| 1415 | Lophospermum scandens | ♄ | *t*§ | steigende, schön für Töpfe | — | 45 | 2 |
| 1416 | Lotus Jacobaeus | | *mt* | schwarzblühender Schotenklee | 4 | 5 | 1 |
| 1417 | — — fl. luteo | | *mt* | gelbblühender | 4 | 5 | 1 |
| 1419 | Lupinus affinis | ⊙ | * | ähnlich der **Lupinus nanus**, doch länger blühend und stärker im Wuchs | 1⅔ | 3 | ½ |
| 1420 | — Cruikshankii | ⊙ | | dunkelblaue, 3′ hohe, sehr beliebte Sorte | ⅓ | 1 | ½ |
| 1421 | — grandifolius | 4 | | großblättrige purpurne | — | 10 | 1 |
| 1422 | — guatemalensis | ⊙ | | von Guatemala | ⅔ | 1½ | ½ |
| 1423 | — Hartwegii | ⊙ | | Hartweg's ausgezeichnet schöne | 1 | 1½ | ½ |
| 1424 | — — coelestinus | ⊙ | | himmelblaue | 1 | 1½ | ½ |
| 1425 | — — fl. albo | | *m* | weiße | 1 | 1½ | ½ |
| 1426 | — — fl. roseo | ⊙ | | röthliche | 1 | 1½ | ½ |
| 1429 | — hirsutus albus | ⊙ | | weiße behaarte | ¼ | 1 | ⅓ |
| 1430 | — — coeruleus | ⊙ | | große hübsche blaue | ⅓ | 1 | ½ |
| 1431 | — — ruber | ⊙ | | — — rothe | ⅕ | 1 | ½ |
| 1432 | — luteus | ⊙ | | gelbe ... à 100 *Lb.* 3½ *Rc.* | 1/15 | 1 | ½ |
| 1433 | — Termis | ⊙ | | weißliche | 5/12 | 1 | ½ |
| 1434 | — angustifolius | ⊙ | | ... à 100 *Lb.* 5 *Rc.* | 1/12 | 1 | ½ |
| | Aus dieser Lupine soll der Victoria-Caffee bereitet werden. | | | | | | |
| 1435 | — hirsutissimus | ⊙ | | kleinblumige violettrothe behaarte | 2 | 3 | ½ |
| 1436 | — hybridus insignis | ⊙ | | sehr schön rothblühende Species, 3—4′ hoch | 1 | 1½ | ½ |
| 1437 | — — **nigrescens** | ⊙ | | neu, ganz dunkele Varietät, sehr schön | 2 | 3 | ½ |
| 1438 | — — superbus | ⊙ | | purpurlilla mit gelb und weiß | ⅝ | 1½ | ½ |
| 1439 | — Moritzianus | ⊙ | | dunkelblau, 3′ hoch | ⅝ | 1½ | ½ |
| 1440 | — mutabilis | ⊙ | | veränderliche, wohlriechende, 3′ hoch | ⅔ | 1 | ½ |
| 1441 | — — variecolor | ⊙ | | hübsche neue Varietäten | 1 | 1½ | ½ |
| 1442 | — nanus | ⊙ | * | sehr schöne Zwerg- | 1 | 1½ | ½ |
| 1443 | — — fl. albo | ⊙ | * | glänzend weiß, im Verblühen lilla marmorirt | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1444 | — perennis | 4 | | dauernde | — | 5 | 1 |
| 1445 | — polyphyllus | 4 | | trägt herrliche blaue Rispen von 2′ Länge, in vielen Nüancen | 1 | 1½ | ½ |
| 1446 | — — fl. albo | 4 | | rein weiße | — | 4 | 1 |
| 1447 | — pubescens | ⊙ | | feinhaarige dunkelblaue | ⅝ | 1½ | ½ |
| 1448 | — tricolor elegans | ⊙ | | purpurrosa, weiß und gelb, extra | ⅔ | 1 | ½ |
| 1449 | — species ex Texas | ⊙ | | aus Texas, prachtvoll, ½′ hoch | — | 12 | 1½ |
| 1450 | — sulphureus superbus (Menziesii) | ⊙ | | prachtvolle hochgelbe Lupine mit ¾—1′ langen Blüthenrispen | 4 | 5 | 1 |
| 1451 | — Urii | ⊙ | | gelbblühende mit hellem Korn | 3 | 4 | 1 |
| 1452 | — venustus | ⊙ | | liebliche blaue | ⅖ | 1 | ½ |
| 1453 | — | ⊙ | | hohe Sorten gemischt | ½ | 1 | ½ |
| 1454 | — | ⊙ | | mittelhohe Sorten gemischt | ½ | 1 | ½ |
| 1455 | — | ⊙ | | niedrige Sorten gemischt | 1/3 | 2 | ½ |
| 1456 | Lychnis chalcedonica | 4 | | brennende Liebe | 1/6 | 2 | ½ |
| 1457 | — — alba | 4 | | weiße | 1½ | 2 | ½ |
| 1458 | — — carnea | 4 | | fleischfarbene | 1½ | 2 | ½ |
| 1459 | — **fulgens** | 4 | *E* | leuchtend rothe, prachtvolle | 6½ | 8 | 1 |
| 1460 | — **hybrida Haageana** | 4 | *E* | (Benary) prächtig purpurzinnober und ähnliche Nüancen, extra | 12 | 14 | 1½ |
| 1461 | — Sieboldii | 4 | *E* | glänzend weiß (variirt) | — | 30 | 1 |
| 1462 | — viscaria splendens | 4 | | hübsch, blühet schon Anfang Mai | — | 10 | 1 |
| 1463 | Lythrum roseum superbum | 4 | | hochroth, prächtig | — | 4 | 1 |
| 1464 | — virgatum | 4 | | ruthenförmig | — | 4 | 1 |

| № | | | | à Th. Rt. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1465 | Malope grandiflora alba | ⊙ | großblumige weiße, 1½′ hoch | ¾ | 1½ | ½ |
| 1466 | — — purpurea | ⊙ | — purpurrothe, 1½′ hoch | ¾ | 1 | ½ |
| 1467 | Malva crenulata | t♄ | blüht frühzeitig, rosa à 1000 K. 10 Sgr. | 1/2 | 16 | 1½ |
| 1468 | — — rosea alba variegata | t♄ | rosenroth mit weiß gestreift | — | 25 | 1½ |
| 1469 | — crispa | ⊙ | krausblättrige | — | 25 | 1½ |
| 1470 | — mauritiana | ⊙ | mauritianische | ¾ | 1½ | ½ |
| 1472 | — miniata | mt | mennigrothe, zierlich | 1 | 1½ | ½ |
| 1473 | — Morenii | 4E | Morenische, reichblühend | 4 | 5 | 1 |
| 1474 | — nigra | 4 | einfache schwarzblühende Malve, guter Farbestoff | 4 | 5 | 1 |
| 1475 | Mandevilla suaveolens | t§ | wohlriechende Schlingpflanze | ⅔ | 1 | ½ |
| 1476 | Martynia craniolaria | mt | ahornblättriges Gemsenhorn | — | 10 | 1 |
| 1477 | — formosa | mt | schönstes rothblühendes | 2½ | 4 | 1 |
| 1478 | — lutea | mt | hübsches reichblühendes gelbes | 2½ | 4 | 1 |
| 1479 | — proboscidea | mt | Elephantenrüssel | 2½ | 4 | 1 |
| 1480 | — | mt | alle Sorten gemischt | 2½ | 4 | 1 |
| 1481 | Matricaria capensis fl. pl. | 4Et | capisches Mutterkraut | 4 | 5 | 1 |
| 1482 | — eximia fl. pl. | 4Et | rein weißes, sehr schön | 4 | 5 | 1 |
| 1485 | Maurandia antirrhiniflora | Et§ | löwenmaulartige | — | 16 | 1 |
| 1486 | — Barkleyana | Et§ | Barkley's schöne blaue | — | 20 | 1½ |
| 1487 | — — alba | Et§ | rein weiße, hübsch à 1000 K. 8 Sgr. | — | 80 | 3 |
| 1488 | — — grandiflora | Et§ | großblumige dunkelviolette | — | 25 | 1½ |
| 1489 | — Laceyana | Et§ | hellrothe | — | 20 | 1½ |
| 1490 | — purpurea grandiflora (coccinea) | Et§ | großblumige dunkelrothe | — | 20 | 1½ |
| 1491 | — | Et§ | alle Sorten gemischt | — | 20 | 1½ |
| 1492 | Medicago intertexta | m | Schneckenklee, Dornenkrone | — | 4 | 1 |
| 1493 | Melampodium macranthum | m | vielblumige gelbblühende | — | 6 | 1 |
| 1494 | Melissa Browniana | 4E | schöne blaue Melisse, 1′ hoch | — | 5 | 1 |
| 1495 | Mesembrianthemum capitatum | mt | kopfförmige Cäsarblume | 6 | 8 | 1 |
| 1496 | — crystallinum | mt | Eiskraut | 2 | 3 | ½ |
| 1497 | — glabrum | mt | glatte röthlichviolette | — | 4 | 1 |
| 1498 | — pomeridianum | mt | Nachmittags blühende, schön | 6 | 8 | 1 |
| 1499 | — tricolor | mt | dreifarbige, sehr schön | 4⅙ | 6 | 1 |
| 1500 | — — fl. albo | mt | glänzend weiße, schön | 4⅔ | 6 | 1 |
| 1501 | Mimosa pudica | tw | schamhafte Sinnpflanze oder Rührmichnichtan | 5 | 6 | 1 |
| 1502 | Mimulus cardinalis | 4E | Cardinals-Gaukler | — | 14 | 1 |
| 1503 | — — grandiflorus | 4E | großblumiger à 1000 K. 6 Sgr. | — | — | 4 |
| 1504 | — — fortunatus | 4E | (als atrosanguineus empfohlen), Varietät mit dunkelblutrothem Auge | — | 18 | 1½ |
| 1506 | — cupreatus | mt | sehr schöne neue Species mit feiner Belaubung, sehr reichblühend und von glänzend kupferscharlachrother Farbe | — | 60 | 2½ |
| 1508 | — moschatus | 4Et | Moschus | — | 35 | 2 |
| 1509 | — quinquevulnerus | mt | schöne Varietäten gemischt | 11 | 12 | 1 |
| 1510 | — — maximus | mt | großblumige Pracht-Hybriden melirt | 14 | 16 | 1 |
| 1511 | — rivularis | m | rein gelber Bach- | — | 8 | 1 |
| | **Mirabilis Jalappa** | m | siehe Sortimente. | | | |
| 1513 | — longiflora alba | m | langblüthige wohlriechende weiße | 1 | 1½ | ½ |
| 1514 | — — violacea | m | echte violette langblüthige | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1515 | Momordica Balsamina | ⊙w§ | Balsam-Apfel, eine interessante Frucht | — | 4 | 1 |
| 1516 | — Charantia | ⊙w | gurkenartiger | — | 4 | 1 |
| 1517 | — Elaterium | 4E | Spritz- oder Bexir-Gurke | 3 | 4 | 1 |
| 1519 | Morina longifolia | 4 | langblättrige, prachtvoll à 100 K. Sgr. | — | 60 | 3 |
| 1520 | Myosotis alpestris | ♂* | schönes Alpen-Vergißmeinnicht | 4½ | 6 | 1 |
| 1521 | — — fl. albo | ♂* | weißblühendes | 2½ | 4 | 1 |
| 1522 | — azorica | mt* | prächtig dunkelblaues | — | 45 | 2 |
| 1523 | — palustris | 4 | blaues Sumpf- | — | 8 | 1 |
| 1524 | Nemesia floribunda | m | blumenreiche zarte weißblühende | — | 8 | 1 |
| 1525 | — versicolor | m | verschiedenfarbige | — | 8 | 1 |
| 1526 | — compacta alba | m | weiße niedrige compacte | — | 8 | 1 |
| 1527 | — — bicolor | m | zweifarbige desgl. | — | 8 | 1 |
| 1528 | — — coerulea | m | blaue desgl. | — | 8 | 1 |
| 1529 | **Nemophila atomaria** | ⊙* | fein punktirte weiße Hainblume | 1 | 1½ | ½ |
| 1530 | — **cramboides** | ⊙* | ganz blaßblaue | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1531 | — — **oculata** | ⊙* | (nicht atomaria oculata), neue prachtvolle, blaßblau mit schwarzem Auge | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1532 | — **discoidalis** | ⊙* | schwarzbraun mit weiß umsäumt | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1533 | — — **elegans** | ⊙* | neue, rothbraun mit weiß umsäumt, sehr schön | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1534 | — — marmorata | ⊙* | die schwarzbraunen Blumen sind weiß marmorirt und bordirt | 1 | 1½ | ½ |
| 1535 | — — **vittata** | ⊙* | neu. Eine schöne Verbesserung der Nemophila discoidalis, dunkelschwarzbraun mit breiterem weißem Saum | — | 1½ | ½ |
| 1536 | — **insignis** | ⊙* | **prachtvolle blaue**, eine der lieblichsten Sommerblumen à 100 th. 22 Rt. | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1537 | — — **alba** | ⊙* | prachtvolle weiße | ¼ | 1 | ½ |
| 1538 | — — **marginata** | ⊙* | weiß mit bläulich marmorirt und hellgerändert | 7/12 | 1 | ½ |
| 1539 | — **maculata** | ⊙* | weißlilla, großblumig mit 5 blauen Flecken in jeder Blume, sehr beliebt à 100 th. 22 Rt. | ⅔ | 1 | ½ |
| 1541 | — | ⊙* | beste Sorten gemischt | ¼ | 1 | ½ |
| 1542 | Nicotiana glauca | t | graugrüner Baum-Taback | ⅔ | 1 | ½ |
| 1543 | Nierembergia gracilis | tm | zierliche à 1000 K. 2½ Sgr. | — | 4 | 1 |
| 1544 | Nigella damascena fl. pl. | ⊙ | Jungfer im Grünen, blau, gefüllt | — | 60 | 2½ |
| 1545 | — hispanica | ⊙ | schöne spanische | ¾ | 1½ | ½ |
| 1546 | — — alba | m | zierend, weißliche spanische | 1 | 1½ | ½ |
| 1547 | — — atropurpurea | m | dunkelpurpurrothe spanische, sehr hübsche Färbung | — | 6 | 1 |
| 1548 | — nana fl. pl. | ⊙* | gefüllte Zwerg- | 6 | 8 | 1 |
| 1549 | Nolana atriplicifolia | m | meldenblättrige Zimbelblume | 5/6 | 1½ | ½ |
| 1550 | — grandiflora | m | großblühende hübsche blaue | 1 | 1½ | ½ |
| 1551 | — — alba | m | weißblühende | 1 | 1½ | ½ |
| 1552 | — paradoxa violacea | m | violett, hübsche Farbe | 1 | 1½ | ½ |
| 1553 | — prostrata | m | liegende, kleinblumige | 1 | 1½ | ½ |
| 1554 | — tenella | m | zarte blaue | 1 | 1½ | ½ |
| 1555 | — | m | vorstehende Sorten gemischt | 1 | 1½ | ½ |
| 1556 | Nycterinia capensis | m | verbreitet Morgens und Abends den kostbarsten Vanille-Geruch | — | 15 | 1½ |
| 1557 | — selaginoides | m* | weiß mit lilla Anflug | 4 | 5 | 1 |
| 1558 | — — fl. albo | m* | rein weiße | 4 | 5 | 1 |
| 1559 | Obeliscaria pulcherrima | m | aus Texas, Blumen sammetartig dunkelbraun, gelb umsäumt | 3 | 4 | 1 |
| 1561 | Ocymum Basilicum bullatum | ⊙tw | größter Mulden- oder Schiffs-Basilikum für Zimmer, echt | — | 15 | 1 |
| 1562 | Oenothera bistorta Veitchiana | m | gelb- und reichblühend, auch für Felsenpartieen geeignet | 3 | 4 | 1 |
| 1565 | — coccinea | ⊙ | prächtig, von leuchtend rosenrother Farbe, 1′ hoch | 2 | 3 | ½ |

| № | | | | à Th. Rt. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | Oenothera Drummondii | m | schöne buschige gelbe | 4 | 5 | 1 |
| 1567 | — — nana | m | hübsche niedrigere | 5 | 6 | 1 |
| 1568 | — Fraserii | 4 | Fraser's | — | 5 | 1 |
| 1569 | — fruticosa major | 4t | hübsche gelbe, auch für Topfcultur | — | 15 | 1 |
| 1571 | — Lamarkiana | ♂E | prachtvoll, blüht schon im ersten Jahre so reichlich, daß eine Pflanze 200—600 Blumen bringt, 3′ hoch mit Blumen von 3″ Durchmesser | 1½ | 2 | ½ |
| 1572 | — missouriensis | 4* | gelbe großblumigste, prachtvoll, selten | — | 15 | 1½ |
| 1573 | — odorata | m | wohlriechende | 1½ | 2 | ½ |
| 1575 | — rosea | tm* | neue rosenrothe, niedrig und sehr zierlich | — | 15 | 1 |
| 1576 | — Sellovii | m | sehr großblumige gelbe | 2 | 3 | ½ |
| 1577 | — taraxacifolia fl. albo (acaulis) | m | stengellose, sehr großblumige weiße Nachtkerze | 6 | 8 | 1 |
| 1578 | — tetraptera | m | vierflügelige, hübsch | 2 | 3 | ½ |
| 1579 | — versicolor (cinnabarina) | m | verschiedenfarbige, dunkelgelb in orangefarben übergehend | 1½ | 2 | ½ |
| 1580 | Ononis rotundifolia | 4 | Hauhechel, rundblättrig, rosenroth | — | 40 | 2 |
| 1581 | Onopordon tauricum (virens) | 4 | taurische Krebsdistel | 2 | 3 | 1 |
| 1582 | Orobus Fischerii | ⊙ | Fischer's rothe Walderbse | 1½ | 2 | ½ |
| 1583 | — lathyroides | 4 | blaue, traubenblüthig, sehr schön | 3 | 4 | 1 |
| 1584 | Oxalis rosea | mt | rosenrother Sauerklee, sehr schön | 12 | 14 | 1½ |
| 1585 | — tropaeoloides | ⊙* | mit braunen Blättern, sehr zierlich, ähnlich dem Trauerklee | — | 18 | 1½ |
| 1586 | Palafoxia texana | m | braunrothe Palafoxie, schön | 1½ | 2 | ½ |
| 1587 | Papaver bracteatum | 4 | brennend rother, großer prächtiger Mohn | 4 | 5 | 1 |
| 1588 | — croceum | 4E | safranfarbiger | — | 20 | 1½ |
| 1589 | — giganteum | ⊙ | weißer Riesenmohn mit Köpfen von ungewöhnlicher Größe | ⅕ | 1 | ½ |
| 1590 | — monstrosum | ⊙ | blüht einfach rosenroth und bildet um den Kopf bis 30 kleine Köpfchen, interessant | 1 | 1½ | ½ |
| 1591 | — **Mursellii fl. pl.** | ⊙ | weiß mit roth gesprenkelt, sehr schön | 2 | 3 | ½ |
| 1592 | — — fl. lillacino pl. | ⊙ | lilla mit roth gesprenkelt, extra | 1½ | 2 | ½ |
| 1593 | — — splendens fl. pl. | ⊙ | leuchtend rosa mit weiß (variirt) | 1½ | 2 | ½ |
| 1594 | — orientale | 4 | morgenländischer großblum., purpur | — | 10 | 1 |
| 1595 | — **paeoniflorum nanum fl. pl.** | ⊙ | Zwerg-Päonienmohn, weiß mit kupferscharlach, neu und sehr schön | 3 | 4 | 1 |
| 1596 | — Rhoeas fl. pl. | ⊙ | gefüllter Ranunkelmohn, gemischt | 1⅙ | 2 | ½ |
| | — **paeoniflorum u. somniferum** | | siehe Sortimente. | | | |
| 1597 | Passiflora coerulea | t§ | blaue Passionsblume | — | 5 | 1 |
| 1598 | — gracilis | t§ | zierliche schlankwachsende | — | 8 | 1 |
| 1599 | Paulownia imperialis | 4t | kaiserliche | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1600 | **Pelargonium** hybridum grandiflorum | tE | von den schönsten und neuesten großblumigen englischen, belgischen und französischen Sorten gesammelt à 1000 K. 5 Rt. | — | — | 4 |
| 1601 | — Fancy | tE | Fantaisie à 1000 K. 3 Rt. à 100 K. 12 Sgr. | — | — | 2½ |
| 1602 | — Odier (Diadematum) | tE | neue fünffleckige Prachtsorte à 1000 K. 4 Rt. à 100 K. 15 Sgr. | — | — | 3 |
| 1603 | — scarlet | tE | von schönen Sorten gesammelt à 100 K. 2 Sgr. | — | 10 | 1 |
| 1604 | Pentstemon atropurpureum | 4E | Bartfaden | — | 8 | 1 |
| 1605 | — digitalis | 4 | fingerhutähnlicher | 3 | 4 | 1 |
| 1606 | — Murayanus | t | scharlachrother | — | 60 | 2½ |
| 1607 | — pubescens | 4 | behaarter, reichblühend, schön | 2½ | 4 | 1 |
| 1608 | **Perilla nankinensis** | m | scharfgesägte Perille, prächt. Blattpflanze von schwarzbrauner Farbe | 2 | 3 | 1 |
| 1609 | **Petunia hybrida** | mt | in hübschen Nüancen | 8 | 10 | 1 |
| 1610 | — — | mt | **1. Rang**, nur von sehr schön gezeichneten Blumen gesammelt à 1000 K. 3 Sgr. | — | 20 | 1½ |
| 1611 | — — **Countess of Ellesmere** | mt | tief rosa mit weißem Schlunde, extra | — | 20 | 1½ |
| 1612 | — — **grandiflora** | mt | **1. Rang**, nur von großblumigen, schön gezeichneten Sorten gesammelt à 10,000 K. 1⅓ Rt. à 1000 K. 5 Sgr. | — | — | 3 |
| 1613 | — — **Inimitable** | m | großblumig, roth mit rein weiß gefleckt und geändert, prachtvoll (variirt) à 10,000 K. 1⅓ Rt. à 1000 K. 5 Sgr. | — | — | 3 |
| 1614 | — — **kermesina** grandiflora | mt | schöne großblumige carmoisinrothe, prachtvoll für Gruppen à 1000 K. 4 Sgr. | — | 50 | 2½ |
| 1617 | — — **marginata** | mt | großblumige grüngeränderte Varietäten von nur gegenseitig befruchteten, in Töpfen cultivirten Pflanzen gesammelt .. à 10,000 K. 3 Rt. à 1000 K. 10 Sgr. | — | — | 4 |
| 1618 | — — **venosa** | mt | schön geaderte Nüancen | — | 20 | 1½ |
| 1619 | — — fl. pl. | mt | von sehr sorgfältig befruchteten vorzüglichsten Sorten gesammelt, liefern ca. 10 % echte gefüllte à 1000 K. 20 Sgr. | — | — | 5 |

Vorstehende Petunien aus Samen variiren, man pflanze daher etwas enger und entferne die geringern, sobald sich solche zeigen.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620 | Petunia mirabilis (Salpigl. integrif.) | m | kriechende Petunie, die bekannte schöne vollblühende rothe | 4 | 5 | 1 |
| 1621 | — nyctaginiflora | m | weiße | 2 | 3 | ½ |
| 1622 | Phacelia congesta | ⊙ | gedrängte blaublühende | 1 | 1½ | ½ |
| 1623 | — tanacetifolia | ⊙ | tanacetumblättrige, schön | 1 | 1½ | ½ |
| 1624 | Phalacraea coelestina | mt | himmelblau, auch für Töpfe zum Winterflor | 3½ | 5 | 1 |
| 1625 | Phaseolus bicolor | ⊙§ | buntblühende Bohne | 1/10 | 1 | ½ |
| 1626 | — ensiformis gigas | m§ | Riesen-Bohne, 2—3′ lang, Zierpflanze | 1 | 1½ | ½ |
| 1627 | **Phlox Drummondii** | mt | Drummond's prächtige Flammenblume in schönster Melange | 8 | 10 | 1 |
| 1628 | — — coccinea | mt | ganz rein feuerfarbener, zu weitleuchtenden Gruppen prachtvoll | 15 | 16 | 1½ |
| 1629 | — — atropurpurea | mt | rein dunkelpurpurrothe Nüancen, desgl. | 15 | 16 | 1½ |
| 1630 | — — rosea | mt | prachtvolle rosenrothe Nüancen | 15 | 16 | 1½ |
| 1631 | — — alba stellata | mt | weißgesternte prachtvolle Nüancen | 15 | 16 | 1½ |
| 1632 | — — fl. albo | mt | rein weiß | — | 25 | 2 |
| 1633 | — — — oculata | mt | weiß mit röthlichem Stern | — | 20 | 1½ |
| 1634 | — — Leopoldii | mt | rothe Varietäten mit weißem Stern | 15 | 16 | 1½ |
| 1635 | — — marmorata rosea | mt | weiß, rosa geäugt und marmorirt | — | 25 | 2 |
| 1636 | — — — violacea | mt | — violett — — — | — | 25 | 2 |
| 1637 | — — Radowitzii | mt | rosenroth mit weiß gestreift | 15 | 16 | 1½ |
| 1638 | — — — Wilhelm I. | mt | prächtig dunkelroth mit weiß gestreift, extra | — | 30 | 2 |

| № | | | | à Th. Rt. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639a | **Phlox Drummondii** Radowitzii Princess Royal | *mt* | lilla mit weiß gestreift, extra | 16 | 18 | 1½ |
| 1639b | — — rosea alba oculata | *mt* | neu und sehr schön, rosa mit weißem Stern | — | 30 | 2 |
| 1640 | — — | *mt* | violette Varietäten mit weißem Stern | 15 | 16 | 1½ |
| 1641 | — perennis hybrida | ♃ | in vielen schönen Sorten gemischt | — | 12 | 1 |
| 1642 | — — suffruticosa | ♃ | von den neuesten Prachtsorten gesammelt | — | 20 | 1½ |
| 1643 | **Phygelius capensis** | *tb* | prachtvoll scharlach mit citronengelb | — | 60 | 2½ |
| 1644 | **Phytolacca esculenta** | ♃ | Kermesbeer, schöne Gruppenpflanze, die Blätter als Spinat | 1 | 1½ | ½ |
| 1646 | **Podolepis affinis** | *tm* | Stielschuppe, großblumig | 5 | 6 | 1 |
| 1647 | — auriculata | *m* | sehr großblumige gelbe | — | 8 | 1 |
| 1648 | — chrysantha | *m* | schöne goldgelbe | — | 8 | 1 |
| 1649 | — gracilis | *m* | zierliche Podolepis | — | 12 | 1 |
| 1650 | — — fl. albo | *m* | rein weiße | — | 12 | 1 |
| 1651 | **Poinciana Gillesii** | ♄ | Pfauenschwanz, schön | — | 6 | 1 |
| 1652 | **Polemonium album** | ♃ | weißblühende Himmelsleiter | 1 | 1½ | ½ |
| 1653 | — coeruleum | ♃ | violette — | 1 | 1½ | ½ |
| 1654 | **Polycolymna Stuartii** | *m* | Immortelle, große weißgelbe Staubfäden | — | 6 | 1 |
| 1657 | **Polygonum orientale** | ⊙ | rothblüh. morgenländischer Knöterich, zu Gruppen sehr schön | 1 | 1½ | ½ |
| 1658 | — — pumilum | ⊙ | neu, eine schöne Verbesserung des beliebten Polygonum orientale, indem diese ganz constante Varietät nur circa halb so hoch wächst | 1 | 1½ | ½ |
| 1659 | — speciosum | ⊙ | reicher und länger blühend, als orientale | 1½ | 2 | ½ |
| 1660 | **Poppia Fabiana** | ⊙ | Cucurbitacee mit grünen länglichen Früchten und weinartigem Laube | — | 8 | 1 |
| 1661 | **Portulaca** alba rubra striata | *mt** | weiß, bisweilen rothgestreift | 8 | 10 | 1 |
| 1662 | — aurea | *mt** | dunkelgelber | 8 | 10 | 1 |
| 1663 | — caryophylloid. carminea striata | *mt** | rosenroth mit carmin gestreift und gestrichelt | 8 | 10 | 1 |
| 1664 | — lutea aurea striata | *mt** | schwefelgelb, goldgelb gestreift | 8 | 10 | 1 |
| 1665 | — Gillesii | *mt** | carmoisinrother | 8 | 10 | 1 |
| 1666 | — incarnata | *mt** | fleischfarbener | 8 | 10 | 1 |
| 1667 | — rosea | *mt** | rosenrother | 8 | 10 | 1 |
| 1668 | — Thellusonii | *mt** | orangescharlachrother | 8 | 10 | 1 |
| 1669 | — Thorburnii | *mt** | schwefelgelber | 8 | 10 | 1 |
| 1670 | — | *mt** | vorstehende Sorten gemischt | 6 | 8 | 1 |
| 1671 | — grandiflora fl. pl. | *mt** | gefülltes Portulakröschen in verschiedenen Farben, I. Qualität. Wenngleich noch etwas in die älteren Sorten variirend, liefert dieser Same doch bereits mindestens 75 pCt. extra gefüllte Blumen à 1000 K. 1⅙ Rt. à 100 K. 5 Sgr. | — | — | 5 |
| 1672 | **Potentilla atrosanguinea** | ♃ | dunkelrothes Fingerkraut | — | 8 | 1 |
| 1673 | — formosa | ♃ | schönes blaßrothes | 5 | 6 | 1 |
| 1674 | — hybrida | ♃ | schöne und neue Hybriden gemischt | — | — | 1½ |
| 1675 | **Primula Auricula** | ♃ | Lucker Aurikeln in guter Melange | — | 50 | 2½ |
| 1676 | — — | ♃ | von feinsten Nüancen **1. Ranges, extra** | — | 80 | 4 |
| 1677 | — — | ♃ | nur von ausgezeichnetsten **Nummerblumen** gesammelt à 1000 K. 10 Sgr. | — | — | 6 |
| 1678 | — **chinensis** fl. albo | ♂*Et* | weiße chinesische Topfprimel | — | 75 | 2½ |
| 1679 | — — fl. rubro | ♂*Et* | rein rothe | — | 35 | 2 |
| 1680 | — — | ♂*Et* | weiße u. rothe gewöhnliche gemischt | — | 60 | 2 |
| 1681 | — — albo rubro striato | ♂*Et* | weiß mit roth gestreift | — | 75 | 2½ |
| 1682 | — — **cupreata** (carm. rosea) | ♂*Et* | kupfercarminrothe oder carminrosa, prächtig à 1000 K. 10 Sgr. | — | 100 | 3 |
| 1683 | — — **erecta superba** | ♂*Et* | prachtvolle constante und distincte Varietät mit aufrechtstehenden Blättern und Blumen, sehr reichblühend à 1000 K. 15 Sgr. | — | 150 | 4 |
| 1684a | — — **fimbriata** alba, **I. Rg.** | ♂*Et* | großblumige gefranzte weiße, extra à 1000 K. 18 Sgr. | — | 240 | 5 |
| 1684b | — — — — | ♂*Et* | großblumige gefranzte weiße, von französischen Züchtern gezogen | — | — | 3 |
| 1685a | — — — rubra, **I. Rg.** | ♂*Et* | großblumige gefranzte rothe à 1000 K. 18 Sgr. | — | 210 | 5 |
| 1685b | — — — — | ♂*Et* | großblumige gefranzte rothe, von französischen Züchtern gezogen | — | 90 | 3 |
| 1686 | — — — **purpurea** | ♂*Et* | (Dippe) leuchtend purpur, prachtvoll. Obgleich diese Sorte noch in Primula chin. fimbr. rubra variirt, so ist sie doch eine werthvolle Verbesserung derselben, zumal sie dieselbe auch vielfach durch früheres Blühen und größere Blumen übertrifft à 1000 K. 1 Rt. | — | 360 | 8 |
| 1687 | — — — **striata** | ♂*Et* | großblumige gefranzte, weiß mit roth gestreift à 1000 K. 20 Sgr. | — | 240 | 6 |
| 1688 | — — — **kermesina splendens** | ♂*Et* | leuchtend sammetglänzend carminroth mit gelbem Schlund und braunem Stern, im weitern Verblühen in kupfercarmoisin übergehend mit leuchtenden brillanten Farben. Verbessert à 1000 K. 25 Sgr. | — | 300 | 7 |
| 1689 | — — — **erecta superba** | ♂*Et* | neu, prachtvoll, von nur gefranzten Blumen gesammelt à 1000 K. 1 Rt. | — | 360 | 8 |

Primelsamen liefern wir stets nur in gut keimfähiger Qualität. Während des Aufganges muß derselbe recht feucht gehalten und schattirt werden. Unsere Culturen darin sind sehr ausgedehnt und erregte der diesjährige Flor von mehr als 9000 Töpfen nicht allein der Menge, sondern hauptsächlich der vorzüglichen Qualität wegen, die allgemeine Bewunderung der Blumenfreunde.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | **Primula cortusoides** | ♃*t* | leuchtend rosenrothe Primel. Im freien Lande cultivirt giebt dieselbe eine herrliche Frühlingsflor, besonders in Gruppen oder ganzen Beeten | — | 16 | 1½ |
| 1691 | — **veris elatior** | ♃* | sehr schöne Gartenprimel in vielen Nüancen I. Ranges | 14 | 15 | 1½ |
| 1692 | — — — | ♃* | desgl. hübsche Nüancen 2. Ranges | 6 | 8 | 1 |
| 1693 | **Prunella grandiflora** | ♃*E* | großblühende | 3 | 4 | 1 |
| 1694 | **Pyrethrum** carneum | ♃ | fleischfarbige | 4 | 5 | 1 |
| 1695 | — roseum | ♃ | hellrosenrothe | 4 | 5 | 1 |
| 1696 | — atroroseum | ♃*E* | dunkelrosenrothe prächtige Nüancen | 6 | 8 | 1 |
| 1697 | — **atrosanguineum** | ♃*E* | prachtvoll blutrothe Varietäten | 10 | 12 | 1 |

Pyrethrum roseum und carneum liefern das vielgerühmte orientalische Insectenpulver.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | **Reseda** alba | ♃*E* | hohe weiße Reseda | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1699 | — **odorata** | ⊙ | wohlriechende — à 100 *th.* 40 Rt. | 7/15 | 1 | ½ |
| 1700 | — — **grandiflora** (major) | ⊙ | in Blüthe und Wuchs größer als die gewöhnliche, und besonders für Topfcultur besser geeignet à 100 *th.* 45 Rt. | ½ | 1 | ½ |
| 1701 | **Reseda odorata** arborea | ⊙ | diese Reseda läßt sich leichter baumartig ziehen als die übrigen Sorten | — | 6 | 1 |
| 1702 | — myriophylla | ♃*E* | fast wie R. alba, nur etwas niediger und reichblühender | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1703 | **Rheum Queen Victoria** | ♃ | sehr großblättriger | — | 4 | 1 |
| 1704 | — undulatum | ♃ | wellenförmiger Rhabarber | ⅓ | 1 | ½ |
| 1705 | **Rhodanthe Manglesii** | *mt* | eine der lieblichsten Immortellen | 11 | 12 | 1 |
| 1706 | — **maculata** | *mt* | prachtvolle Gattung aus Australien. Die Pflanze ist robuster als die der Rh. Manglesii, die Blumen sind weit größer u. haben einen dunklen Ring in der Mitte | 22 | 25 | 1½ |
| 1707 | — — **alba** | *mt* | neue glänzend weiße; in Form und Bau der vorstehenden gleich | — | 28 | 1½ |
| 1709 | **Rhododendron ponticum maximum** | ♄ | pontische Alpenrose | — | 8 | 1 |
| 1710 | **Rhodochiton volubile** | ♄§ | prachtvolle Schlingpflanze | — | — | 6 |
| 1711 | **Ricinus** major | *m* | großer Wunderbaum | ½ | 1 | ½ |
| 1712 | — minor | *m* | kleiner — | ⅓ | 1 | ½ |
| 1713 | — africanus albidus | *m* | weißlicher — | 2 | 3 | 1 |
| 1714 | — purpureus | *m* | purpurrother, schön | 2 | 3 | 1 |
| 1715 | — — major | *m* | größter | 2 | 3 | 1 |
| 1716 | — **sanguineus** | *m* | blutrother, Pracht-Gruppenpflanze von colossalen Dimensionen 1½' | ⅗ | 1 | ½ |
| 1717 | — — minor | *m* | kleiner blutrother, neu 2½' | 2 | 3 | 1 |
| 1718 | — — **tricolor** | *m* | neu, mit großer grüner, dunkelschattirter, roth punktirter Frucht und braunen Stacheln | 2 | 3 | 1 |
| 1719 | **Rudbeckia amplexicaulis** (Dracopis) | ⊙ | Drachenauge, stengelumfassendes | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1720 | — fulgida (Centrocarpha) | ♃*E* | schwefelgelbes | — | 15 | 1½ |
| 1721 | **Sabbatia campestris** (Gentianeae) | *tm* | tief rosenrothe Blume mit gelbem Stern (feucht und warm auszusäen) à 1000 K. 5 Sgr. | — | — | 5 |
| 1722 | **Salpiglossis variabilis** | *m* | Prachtsorten, gemischt | — | 10 | 1 |
| 1723 | — — alba lutea | *m* | weiß mit gelb | — | 12 | 1 |
| 1724 | — — azurea grandifl. | *m* | großblumige blaue | — | 12 | 1 |
| 1725 | — — coccinea | *m* | scharlachrothe | — | 12 | 1 |
| 1726 | — — sulphurea | *m* | schwefelgelbe | — | 12 | 1 |
| 1729 | **Salvia argentea** | ♃*t* | prachtvolle Blattpflanze, silberblättrig | — | 12 | 1 |
| 1730 | — bracteata | ♃ | schön lillafarbig | — | 6 | 1 |
| 1731 | — coccinea | *tm* | scharlachrothe, prachtvolle | 8 | 10 | 1 |
| 1732 | — — **pumila** | *m* | (Dippe). Diese prächtige Varietät wird nur halb so hoch als Salvia coccinea, ist ganz constant und sehr werthvoll für Gruppen | — | 25 | 1½ |
| 1733 | — — punicea nana | *tm* | wird 1½' hoch und blühet unaufhörlich prachtvoll scharlach | — | 12 | 1 |
| 1734 | — Horminum | ⊙ | Scharlachkraut | 1 | 1½ | ½ |
| 1735 | — — violacea | ⊙ | violett geschopfte | 1 | 1½ | ½ |
| 1736 | — Roemeriana | *mt** | scharlachcarmoisin | — | 20 | 1½ |
| 1738 | **Sanvitalia procumbens** | *m** | liegende Sanvitalie | 5 | 6 | 1 |
| 1739 | **Saponaria multiflora** (calabrica) | ⊙* | ein sehr schönes, allgemein beliebtes, rothblühendes Sommergewächs zu Gruppen und Einfassungen | 1⅙ | 2 | ½ |
| 1740 | — — alba | ⊙* | rein weiß, sehr schön | 2 | 3 | ½ |
| 1741 | — — **marginata** | ⊙* | neu, fleischfarbiges | 1⅙ | 2 | ½ |
| 1742 | — — rosea | ⊙* | rosenrothes | 1⅙ | 2 | ½ |
| 1743 | — ocymoides | ♃ | basilienartiges Seifenkraut, sehr schön für Felsenpartieen | 5 | 6 | 1 |
| 1744 | **Scabiosa atropurpurea** | *m* | gewöhnliche gemischt | 1⅔ | 3 | ½ |
| 1745 | — caucasica connata | ♃ | sehr hübsch, lillafarbig | — | 6 | 1 |
| 1746 | — major (atropurp. grandiflora) | *m* | schönste hohe großblumige, gemischt | 2 | 3 | ½ |
| 1747 | — — miniata | *m* | mennigrothe | 2 | 3 | ½ |
| 1748 | — nana | *m* | niedrige Zwerg-, diverse Nüancen | 1⅔ | 3 | ½ |
| 1749 | **Schizanthus Grahamii** | *mt* | prächtige rothe Spaltblume | — | 8 | 1 |
| 1750 | — — carneus | *mt* | fleischfarbige | — | 8 | 1 |
| 1751 | — retusus | ♂*E* | Hooker's überaus prachtvolle | 7 | 8 | 1 |
| 1752 | — — albus | ♂*E* | schöne weiße, inwendig gelb | — | 10 | 1 |
| 1753 | — pinnatus | ⊙ | gefiederte Schlitzblume | 1½ | 2 | ½ |
| 1754 | — — albus | ⊙ | weiße | 3 | 4 | 1 |
| 1755 | — — humilis | ⊙ | niedrige, hübsch | 1½ | 2 | ½ |
| 1756 | — species de Chili | ⊙ | blaue von Chili | 1½ | 2 | ½ |
| 1757 | — grandiflorus oculatus | ⊙ | brillant purpur, in div. Nüancen | 4 | 5 | 1 |
| 1758 | **Schizopetalum Walkerii** | *mt* | Spaltblume, sehr wohlriechend und interessant | — | 8 | 1 |
| 1759 | **Scutellaria macrantha** | ♃*E* | großblumiges blaues Helmkraut | — | — | 1½ |
| 1760 | **Scyphantus elegans** | *m*§ | Tassenblume, reichblühend | — | 20 | 1½ |
| 1761 | **Sedum Aizon** | ♃*E* | gelbblühende Alpenpflanze | — | 8 | 1 |
| 1762 | — anglicum | ♃ | niedlich zu Felsenpartieen | — | 8 | 1 |
| 1763 | — coeruleum | *tm** | für Töpfe und zarte Einfassungen sehr hübsch a) mit Hülse | — | 8 | 1 |
| | | | b) ohne — | — | 30 | 2 |
| 1764 | — elegans | ♃ | zierliches | — | 15 | 1 |
| 1765 | — Kamtschaticum | ♃ | schön großdoldig | — | 8 | 1 |
| 1766 | — spurium | ♃*E* | röthliche | — | 8 | 1 |
| 1767 | **Senecio elegans** fl. albo **pl.** | *m* | weißes gefülltes Kreuzkraut | — | 10 | 1 |
| 1768 | — — fl. atrocinereo **pl.** | *m* | aschbraunes, extra gefüllt | — | 10 | 1 |
| 1769 | — — fl. atropurpureo **pl.** | *m* | extra gefülltes dunkelpurpurrothes | — | 10 | 1 |
| 1770 | — — fl. lillacino **pl.** | *m* | lillafarbiges, gefülltes | — | 10 | 1 |
| 1771 | — — fl. roseo **pl.** | *m* | rosenrothes gefülltes | — | 10 | 1 |
| 1772 | — — fl. rubro **pl.** | *m* | violettrothes, extra gefüllt | — | 10 | 1 |
| 1773 | — — fl. cupreo **pl.** | *m* | neues kupferrothes, schön gefüllt | — | 10 | 1 |
| 1774 | — — fl. pl. | *m* | vorstehende Sorten gemischt | — | 10 | 1 |
| 1775 | — — nana fl. coeruleo **pl.** | *m** | hellviolettes Zwerg-, 6" hoch, mit compactem kugelförmigen Bau, zu Einfassungen wie zu Gruppen sehr werthvoll | — | 15 | 1½ |
| 1783 | **Silene Armeria** | ⊙ | Mückenfang, ein sehr schönes Sommergewächs für weitleuchtende Gruppen und volle Beete, von lebhaft rother Farbe | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1784 | — — fl. albo | ⊙ | weiße Silene | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1785 | — — fl. carneo | ⊙ | fleischfarbene | 1 | 1½ | ½ |
| 1786 | — Atocion | ⊙* | sehr niedlich, hellrosa | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1787 | — Bergerii | ⊙ | dunkelroth, reichblühend | 1 | 1½ | ½ |
| 1788 | — compacta | ♂*t* | sehr schön gedrängtblühende rothe | — | 12 | 1 |
| 1789 | — integrifolia | ⊙ | hübsche rothe | 1 | 1½ | ½ |
| 1790 | — orientalis | ♂*t* | 3' hohe rothe, prachtvoll großdoldig | — | 12 | 1 |
| 1791 | — ornata | *m* | geschmückte rothe | — | 6 | 1 |
| 1792 | — — fl. albo | *m* | weiße | — | 6 | 1 |
| 1793 | — pendula fl. albo | ⊙ | weiße hängende | 1⅓ | 2 | ½ |
| 1794 | — procumbens | ⊙* | liegende, sehr schön rothblühend | 1 | 1½ | ½ |
| 1795 | — Pseudo-Atocion | ⊙ | schön rosa, reichblühend | 1 | 1½ | ½ |
| 1796 | — **rosea graeca (pendula)** | ⊙* | rosenrothe. (Ueberwinterte Pflanzen geben im Frühling einen herrlichen Flor, besonders für Gruppen in Rasen) | ½ | 1 | ½ |
| 1798 | — Schaffta | ♃* | prächtig rosenrothe, schöne Herbstflor | — | 12 | 1 |
| 1799 | — striata | ⊙ | gestreifte, 2' hohe, schön | — | 4 | 1 |
| 1800 | — | ⊙ | einjährige Sorten gemischt | ⅚ | 1½ | ½ |
| 1801 | **Silibum eburneum** | ♃ | schöne Elfenbein-Distel, Blattpflz. | — | 10 | 1 |
| 1802 | **Solanum Balbisii** | *m* | großblumiger Nachtschatten | — | 5 | 1 |
| 1803 | — Capsicastrum | *t* | schön für Töpfe, schon als kleine Pflanze mit Früchten bedeckt | — | 15 | 1½ |

| № | | | | | à Ut. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | Solanum citrullifolium | | m | hellblau | — | 4 | 1 |
| 1805 | — Lycopersicum monstrosum | | m | großfrüchtiger rother Liebesapfel | $\frac{5}{6}$ | $1\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1806 | — — — luteum | | m | — gelber — | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1807 | — — cerasiforme | | m | kirschförmiger rother — | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1808 | — — — luteum | | m | — gelber — | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1809 | — — | | m | vorstehende 4 Sorten gemischt | $1\frac{1}{3}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1810 | — — erectum | | m | mit aufrechtstehenden Blattstengeln | — | 8 | 1 |
| 1811 | — Melongena fructu coccineo | ⊙ | tm | Eierpflanze mit rother Frucht | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1812 | — — — maximo | ⊙ | tm | allergrößte Riesen- | 3 | 4 | 1 |
| 1815 | — — — rotundo albo | ⊙ | tm | mit weißer eirunder Frucht | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1816 | — — — — violaceo | ⊙ | tm | mit violetter — — | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1817 | — — | ⊙ | tm | vorstehende Sorten gemischt | $2\frac{1}{3}$ | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1818 | — — striatum | ⊙ | tm | gestreifte von Guadeloupe | — | 4 | 1 |
| 1820 | — Pseudo Capsicum | | tm | mit schönen rothen Früchten | — | 18 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1821 | — texanum | | tm | mit glänzend scharlachrothen Frücht. | — | 4 | 1 |
| 1822 | — vescum | | tm | violett, großblumig | — | 6 | 1 |
| 1823 | Sorghum saccharatum | | m | 7′ hoch, zu Gruppen | $1\frac{2}{3}$ | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1824 | Spergula pilifera | 4 | E | für kleine Gruppen, rasenartig | — | — | 2 |
| 1825 | Sphenogyne speciosa | | m | prächtige goldgelbe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1826 | Spilanthus oleraceus | | m | Husarenknopf | — | 6 | 1 |
| 1827 | Stachys coccinea | | mt | rosascharlachrother Ziest, prachtvoll | — | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1828 | Statice Bonduellii | 4 | Et | gelbe, zu Winter-Bouquets | $3\frac{1}{2}$ | 5 | 1 |
| 1829 | — eximia | 4 | | sehr schöne ausdauernde Statice | — | 30 | 2 |
| 1830 | — sinuata | 4 | Et | schöne blaue, besonders beliebt zu Winter-Bouquets | $1\frac{2}{3}$ | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1831 | — — hybrida | | tm | prachtvolle Hybriden in weiß mit gelb, lilla mit gelb ꝛc. | 4 | 5 | 1 |
| 1832 | Stenactis speciosa | 4 | | prächtiger Schmalstrahl | 3 | 4 | 1 |
| 1833 | Stevia Eupatoria | | mt | weißlichroth, sehr schön | — | 10 | 1 |
| 1834 | — Lindleyana | | mt | weißlich, wohlriechend | — | 12 | 1 |
| 1835 | — purpurea | | mt | purpurrothe Stevie | — | 12 | 1 |
| 1836 | Swainsonia Grayana | ♄ | Et | Prachtpflanze à 100 K. 6 Sgr. | — | — | 2 |
| 1837 | — Osburnii | ♄ | | prächtige dunkelpurpurne à 100 K. 4 Sgr. | — | — | $1\frac{1}{2}$ |
| 1838 | Sycios angulata | ⊙ | § | sehr weit rankende Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben und Wänden (Der Same ist anzuschneiden) | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1839 | Tagetes erecta fl. aurantiaco pl. | | m | große gefüllte goldgelbe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1840 | — — — sulphureo pl. | | m | gefüllte schwefelgelbe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1841 | — — — plenissimo | | m | blaßgelbe gefüllteste | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1842 | — — fistulosa fl. aurantiaco pl. | | m | gefüllte goldgelbe, geröhrt | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1843 | — — — fl. sulphureo pl. | | m | — schwefelgelbe — | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1844 | — — nana fl. pl. | | m | schöne niedrige gefüllte | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1845 | — lucida | ⊙ | t | glänzende doldenblüthige, die Blätter sehr wohlriechend | $6\frac{1}{2}$ | 8 | 1 |
| 1846 | — patula fl. aureo pl. | | m | dunkelgelbe gefüllte | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1847 | — — nana fl. pl. | | m | gefüllte Zwerg-Sammetblume, extra | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1848 | — — — fl. luteo pl. | | m | — goldgelbe Zwerg-, extra | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1850 | — — pulchra fl. pl. | | m | gefüllte gelbe mit braunem Auge | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1851 | — — pumila fl. pl. | | m | braune Zwerg- | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1852 | — ranunculoides fl. pl. | | m | ranunkelblüthige gefüllte | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1853 | — — striata pl. | | m | gestreifte, gefüllte, prachtv. (variirt) | 4 | 5 | 1 |
| 1854 | — signata | | m* | vielblumige mit feinem Laube | 4 | 5 | 1 |
| 1855 | — — pumila | | m* | **neu, prachtvoll** zu Einfassungen, ganz constant und sehr reichblühend, bis 1′ hoch | 5 | 6 | 1 |
| 1856 | — erecta | | m | hohe Sorten in Melange | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1857 | — patula | | m | niedrige Sorten in Melange | $1\frac{2}{3}$ | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1860 | Thunbergia alata | | mt§ | geflügelte Thunbergie, blaßgelb mit dunklem Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1861 | — — nova species | | mt§ | desgl. ohne dunkles Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1862 | — — aurantiaca | | mt§ | dunkelgelbe mit dunklem Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1863 | — — — nova species | | mt§ | desgl. ohne dunkles Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1864 | — — fl. albo | | mt§ | weiße mit dunklem Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1865 | — — Bakerii | | mt§ | weiße, ohne dunkles Auge | — | 14 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1866 | Tithonia helianthiflora | | m | sonnenrosenartige Tithonie | — | 6 | 1 |
| 1867 | — tagetiflora | | m | aurorafarbige vom Cap | — | 6 | 1 |
| 1869 | Trachelium album | ♂ | t | weißblühendes Halskraut | — | 15 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1870 | — coeruleum | ♂ | t | blaues, hübsch | — | 8 | 1 |
| 1871 | Trachymene coerulea (Didiscus) | | m | prächtige blaue Trachymene | 4 | 5 | 1 |
| 1872 | Tradescantia virginica | 4 | | in diversen Farben gemischt | — | 8 | 1 |
| 1873 | Trichosanthes anguinea | ⊙ | w | schlangenförmige, sehr interessante Frucht, erreicht eine Länge von 2—4 Fuß | — | 6 | 1 |
| 1874 | — colubrina vera | ⊙ | w | mit gefranzter weißer wohlriechender Blüthe und schlangenförmiger Frucht, 2—4′ lang | 3 | 4 | 1 |
| 1875 | Trifolium rubens | 4 | | rothblühender Klee | — | 4 | 1 |
| 1876 | — suaveolens | ⊙ | t | wohlriechender Klee für Töpfe, in Rußland sehr beliebt | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1877 | **Tropaeolum** majus | ⊙ | § | Nasturtium oder große spanische Kresse | $\frac{2}{3}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1878 | — — atropurpureum | ⊙ | § | hübsche dunkelpurpurbraune | $\frac{2}{3}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1879 | — — coccineum | ⊙ | § | scharlachrothe | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1880 | — — Dunnett's new orange | ⊙ | § | leuchtend rein gelb | 1 | $1\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1881 | — — Eduard Otto | ⊙ | § | lilla mit Atlasglanz | $1\frac{1}{2}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1882 | — — luteum | ⊙ | § | rein gelbe | 1 | $1\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1883 | — — Regelianum | ⊙ | § | prächtig, purpurviolett | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1884 | — — Scheuermannii | ⊙ | § | strohgelb, braun gestreift | $1\frac{1}{3}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1885 | — — — coccineum | ⊙ | § | strohgelb mit hellscharlach gestreift und marmorirt, sehr schön | $1\frac{1}{3}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1886 | — — **nanum** Beauty | ⊙ | * | Zwerg-, ohne Ranken, gelb mit scharlach geflammt | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1887 | — — — purpureum | ⊙ | * | (Cattel's crimson), dunkelpurpurbraunes | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1888 | — — — Crystal Palace Gem | ⊙ | * | strohgelb, roth und braun marmorirt | 1 | $1\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1889 | — — — Pearl | ⊙ | * | neu, gelblichweißes Zwerg- | 1 | $1\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{2}$ |
| 1890 | — — — atrococcineum | ⊙ | * | (Tom Thumb, Carter), Zwerg-, dunkelscharlach, extra | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1891 | — — — spotted | ⊙ | * | gefleckter Zwerg- | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1892 | — — — yellow | ⊙ | * | rein gelber Zwerg- | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1893 | — — — coccineum | ⊙ | * | scharlachrothes | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1894 | — — — | ⊙ | * | Zwerg-, gemischt | $\frac{1}{2}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |

Vorstehende 8 Sorten Tropaeolum nanum ranken nicht, sondern bilden einen schönen kugelförmigen Busch, eignen sich daher zu Gruppen und Einfassungen, wie auch zur Topfcultur.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1895 | Tropaeolum **Lobb. hybr.** atropurpur. | ⊙ | t§ | prachtvoll dunkelpurpurbraun à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1896 | — — — coccineum multiflorum | ⊙ | t§ | reichblühend, scharlach, großblumig à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1897 | — — Brillant | ⊙ | t§ | brennend scharlach, großblumig, dunkellaubig ... à 100 K. 4 Sgr. | — | 6 | 1 |
| 1898 | — — coccineum multifl. | ⊙ | t§ | klein- und vielblumig, scharlach, extra ... à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1899 | — — Duc de Vivence | ⊙ | t§ | canariengelb, zinnober gefleckt à 100 K. 25 Sgr. | — | — | 4 |
| 1900 | — — flammula grandifl. | ⊙ | t§ | scharlach mit gelb geflammt à 100 K. 10 Sgr. | — | — | $2\frac{1}{2}$ |
| 1901 | — — Géant des batailles | ⊙ | t§ | gelblichweiß, roth gefleckt à 100 K. 10 Sgr. | — | — | $2\frac{1}{2}$ |
| 1902 | Tropaeolum **Lobb.** glabrum variegat. | ⊙ | t§ | weißlichgelb, braun gefleckt, bisweilen mit zinnober marmorirt à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1903 | — — Glory | ⊙ | t§ | leuchtend scharlachroth à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1904 | — — Hookerii | ⊙ | t§ | dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1905 | — — Kotschian. multifl. | ⊙ | t§ | scharlach, klein- und vielblumig à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1906 | — — Lilli Smith | ⊙ | t§ | hellscharlach à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1907 | — — Mr. Colmet | ⊙ | t§ | dunkelpurpur, schwarzbraun schattirt à 100 K. 20 Sgr. | — | — | 3 |
| 1908 | — — Napoleon III. | ⊙ | t§ | gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1909 | — — Queen Victoria | ⊙ | t§ | flammend zinnober à 100 K. 20 Sgr. | — | — | 3 |
| 1910 | — — Triomphe d'Hyères | ⊙ | t§ | feurig scharlach, großblumig à 100 K. 5 Sgr. | — | 8 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1911 | — — — du Prado | ⊙ | t§ | weißlichgelb mit scharlachrothen Flecken à 100 K. 20 Sgr. | — | — | 3 |
| 1912 | — — Zanderii | ⊙ | t§ | dunkelscharlach, sehr hochrankend à 100 K. 12 Sgr. | — | — | 2 |
| 1913 | — hybridum et Lobbianum | ⊙ | t§ | in schönsten Nüancen gemischt, 1. Qualität ... à 100 K. 8 Sgr. | — | 12 | 2 |
| 1914 | — — — | ⊙ | t§ | desgl. 2. Qualität | — | 6 | 1 |

Vorstehende Tropaeolum hybridum- und Lobbianum-Arten variiren zwar, aber alle daraus fallenden Pflanzen sind herrliche, für Topf- und Landcultur gleich werthvolle Sorten.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1915 | Tropaeolum minus | ⊙ | § | kleine gelbe, fünffleckige | $\frac{2}{3}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1916 | — — **coccineum** | ⊙ | t§ | prachtvoll feuerroth, überaus reichblühend | 2 | 3 | 1 |
| 1917 | — peregrinum (canariense) | ⊙ | § | gefranzte gelbe, zu Bekleidungen | $2\frac{1}{2}$ | 4 | 1 |
| 1920 | Valeriana alba | 4 | E | weißer Baldrian | — | 6 | 1 |
| 1921 | — coccinea | 4 | E | hochrother, schön | — | 6 | 1 |
| 1922 | — rubra | 4 | E | rother schöner | — | 6 | 1 |
| 1923 | Venidium calendulaceum | | m* | sehr reichblühend, gelb | 4 | 5 | 1 |
| 1924 | Verbascum phoeniceum | ♂ | m | Königskerze, diverse Nüancen | — | 5 | 1 |
| 1925 | — pyramidatum | 4 | | 6′ hohe gelbe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1926 | — Thapsus | 4 | | Königskerze, gewöhnliche gelbe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1927 | Verbena Aubletia | | m | schönes Eisenkraut | — | 8 | 1 |
| 1928 | — — grandiflora | | m | großblühend, sehr hübsch | — | 8 | 1 |
| 1929 | — Drummondii | | m | Drummond's prächtiges in mehreren Nüancen, echt | — | 8 | 1 |
| 1930 | — hybrida | | mt* | großblumige Topfsorten von französischen Züchtern, liefern viel helle Farben | 10 | 12 | 1 |
| 1931 | — — | | mt* | nur von den neuesten und großblumigsten Topfsorten **eigener Zucht 1. Ranges** gesammelt, die bisher allgemeinen Beifall gefunden | — | 35 | 2 |

Die Anzucht der Verbenen aus Samen liefert die erfreulichsten Resultate.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | — pulchella (geraniaefolia) | | m | schönes lillafarbenes | — | 8 | 1 |
| 1933 | — pulcherrima violacea | | m | schönstes violettes, für Gruppen | — | 10 | 1 |
| 1934 | — venosa | | mE* | blaues, schön als Sommergewächs | — | 6 | 1 |
| 1936 | Veronica Bachhofenii | 4 | | schön hellblau, reichblühend | — | 6 | 1 |
| 1937 | — candida | 4 | | prächtiger Ehrenpreis, weißblättrig | — | 10 | 1 |
| 1938 | — grandis | 4 | | großer | — | 5 | 1 |
| 1939 | — pinnata | 4 | | feinblättrig, rein weiß | — | — | 3 |
| 1940 | — Teucrium | 4 | | hübscher blauer | — | 10 | 1 |
| 1941 | — syriaca | | mt | niedrig, sehr zierlich, hellblau | — | 10 | 1 |
| 1942 | — — fl. albo | | m | rein weißer | — | 10 | 1 |
| 1943 | Vicia **Gerardii** | ⊙ | § | Schlingpflanze, sehr reich- und traubenblüthig, von violetter Farbe | 3 | 4 | 1 |
| 1944 | Vinca rosea | ♄ | Ewt | hübsches rothblühendes Sinngrün | — | 10 | 1 |
| 1945 | — — fl. albo | ♄ | Ewt | — weißblühendes — | — | 10 | 1 |
| 1946 | — — nova species | ♄ | Ewt | rein weiß, ohne dunkles Auge | — | 12 | 1 |
| 1947 | Viola tricolor **maxima** | 4 | E | (Pensées) großblühende Stiefmütterchen von guten Blumen in vielen Nüancen | 5 | 6 | 1 |
| 1948 | — — — | 4 | E | desgl. **1. Ranges**, nur von den **ausgezeichnetsten** Prachtblumen gesammelt .... à 1000 K. 4 Sgr. | 26 | 28 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1949 | — — — | 4 | E | von aurikelfarbenen Prachtblumen gesammelt | 16 | 18 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1950 | — — — | 4 | E | von braunrothen französischen Prachtblumen gesammelt | 16 | 18 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1952a | — — — | 4 | E | hellblaue Varietäten | 16 | 18 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1952b | — — — | 4 | E | gestreifte Varietäten | — | 30 | 2 |
| 1953 | — — nigra (Dr. Faust) | 4 | E | kohlenschwarzblühende merkwürdige, ziemlich constante Varietät | — | 25 | 2 |
| 1954 | — — violette bordé blanc | 4 | E | violett mit weißem Rande | 18 | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1955 | — — maxima marmorata | 4 | E | gelbgrundig marmorirt, extra | 18 | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1956 | — — — — | 4 | E | weißgrundig marmorirt, extra | 18 | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1957a | — — — — | 4 | E | neu, sehr dunkle Farben, carmoisin und schwarzpurpur ꝛc. marmorirt, extra | 18 | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1957b | — — — — | 4 | E | vorstehende 3 Sorten gemischt | 18 | 20 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1958 | — — — | 4 | E | von ausgezeichneten **Prachtblumen aller Nüancen** gemischt à 1000 K. 4 Sgr. | 26 | 28 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1959 | Viscaria Buridgii | | m | weißliches | — | 4 | 1 |
| 1960 | — coeli-rosa (Agrostemma) | | m | Himmelsröschen | $1\frac{1}{3}$ | 2 | $\frac{1}{2}$ |
| 1962 | — — fl. albo | | m | rein weißes | — | 5 | 1 |
| 1963 | — Dunnetti | | m | lillafarbiges, hübsch | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1964 | — oculata | | m | dunkeläugiges Lichtröschen, hübsch | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1966 | — — **hybrida** (splendens) | | m | Diese Pflanze wird 1′ hoch, verzweigt sich sehr stark, trägt sich schön und blühet sehr reich in 10—12 der reizendsten Farben | 7 | 8 | 1 |
| 1967 | Wahlenbergia grandiflora | 4 | t | großblumige hellblaue, extra | — | 18 | $1\frac{1}{2}$ |
| 1968 | — — alba | 4 | t | neue rein weiße ... à 1000 K. 15 Sgr. | — | — | 3 |
| 1969 | Whitlavia grandiflora | ⊙ | | glockenblüthig, prächtig blaublühend | $1\frac{2}{3}$ | 3 | 1 |
| 1970 | Xeranthemum annuum fl. albo pl. | ⊙ | | extra gefüllte weiße Papierblume | 2 | 3 | 1 |
| 1971 | — — fl. purpureo pl. | ⊙ | | — — purpurrothe | 2 | 3 | 1 |
| 1972 | — — compactum fl. coeruleo pl. | ⊙ | | niedrig, kleinblumig, reichblühend und compact gebaut, sehr schön | 3 | 4 | 1 |
| 1973 | — — — fl. albo pl. | ⊙ | | weißblühende, vielblumige | 3 | 4 | 1 |
| 1974 | — — plenissimum atropurpureum | ⊙ | | liefert nur extra gefüllte purpurrothe Blumen | — | 10 | 1 |
| 1977 | Zea Caragua | ⊙ | | Riesen-Mais, bis 15′ hoch | $\frac{2}{5}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1978 | — | ⊙ | | blauer, rother, weißer und bunter Papageien-Mais | $\frac{1}{4}$ | 1 | $\frac{1}{2}$ |
| 1979 | Zinnia **elegans** | | m | schöne Zinnie, in vielen Nüancen gemischt | $1\frac{2}{3}$ | 3 | $\frac{1}{2}$ |
| 1980 | — — fl. albo | | m | weiße | $2\frac{1}{2}$ | 4 | 1 |
| 1981 | — — fl. atroviolaceo | | m | violette | $2\frac{1}{2}$ | 4 | 1 |
| 1982 | — — fl. aureo | | m | goldgelbe, sehr schön | $2\frac{1}{2}$ | 4 | 1 |
| 1983 | — — fl. coccineo | | m | scharlachrothe | 2 | 3 | $\frac{1}{2}$ |

| № | | | | | à Pf. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Zinnia elegans | fl. purpureo | m | purpurcarmoisin | 2½ | 4 | 1 |
| 1985 | — — | fl. sulphureo | m | schwefelgelbe | 2½ | 4 | 1 |
| 1986 | — — | fl. aurantiaco pl. | m | prachtvolle orangenrothe von nur extra gefüllten Blumen gesammelt | 4 | 5 | 1 |
| 1987 | — — | fl. coccineo pl. | m | scharlachrothe, desgl. | 4 | 5 | 1 |
| 1988a | — — | fl. kermesino pl. | m | carmoisinrothe, desgl. | 4 | 5 | 1 |
| 1988b | — — | fl. violaceo pl. | m | violette, desgl. | 4 | 5 | 1 |
| 1989 | — — | **fl. pl.** | m | gefüllte prachtvolle, **I. Qualität** in bester Melange | 5 | 6 | 1 |
| 1990 | — — | **fl. pl.** | m | desgl. II. Qualität | 3 | 4 | 1 |
| 1991 | — multiflora lutea | | m | vielblumige gelbe | 2 | 3 | ½ |
| 1992 | — — | rubra | m | — rothe | 2 | 3 | ½ |
| 1993 | — tenuifolia | | m | schmalblättrige | 2 | 3 | ½ |
| 1994 | — verticillata | | m | wirtelblättrige halbgefüllte | — | 6 | 1 |
| 1995 | — species ex Mexico | | m* | mit orangenrothen Blumen, wird 1' hoch | 9 | 10 | 1 |

# Ziergräser.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Aegylops cylindriflora | | m | walzenblüthiges Hartgras | 1½ | 2 | ½ |
| 2002 | Agrostis dulcis | | m | süßes Straußgras | 1½ | 2 | ½ |
| 2003 | — | nebulosa | m | weißgraues, ist eins der schönsten Gräser für Gruppen wie für Bouquets, 1' hoch | 2⅔ | 4 | 1 |
| 2004 | — | pulchella | mt | niedlich, sehr beliebt | 3 | 4 | 1 |
| 2005 | Andropogon Sorghum | | m | 4—5' hohes Bartgras mit braunen Kolben und elegantem Habitus, schön für Blattpflanzengruppen | 3 | 4 | 1 |
| 2006 | Antoxanthum gracile | | ⊙ | Ruchgras | 2 | 3 | ½ |
| 2007 | Briza maxima | | ⊙ | größtes Zittergras | 2 | 3 | ½ |
| 2008 | — | minima | ⊙ | kleinstes — | 1⅓ | 2 | ½ |
| 2009 | — | geniculata | ⊙ | gegliedertes — | — | 4 | 1 |
| 2010 | Brizopyrum siculum | | m | sicilianisches Zitterährchen | 2 | 3 | ½ |
| 2011 | **Bromus brizaeformis** | | m | zittergrasähnliche Trespe, sehr schön zu Bouquets | 1⅓ | 2 | ½ |
| 2012 | — | secalinus giganteus | ♂ | schönes Gras, eine Varietät ohne Grannen | — | 5 | 1 |
| 2013 | Ceratochloa pendula | | ♂m | Horngras, 2' hoch, sehr schön für Bouquets | 1 | 1½ | ½ |
| 2015 | Chloris polystachya | | m* | vielährig, fingerförmig, 1' hoch, schön für Gruppen (ist während des Aufgangs sehr feucht zu halten) | — | 10 | 1 |
| 2016 | Chloris submutata | | m | ungegranntes, 1½' hoch | 2 | 3 | ½ |
| 2017 | Chrysurus cynosuroides (Lamark. aur.) | | m | 6" hoher Goldschwanz | 2½ | 4 | 1 |
| 2018 | Coix Lacrimae | | m | Thränengras (Hiobsthränen) | ½ | 1 | ½ |
| 2019 | Cynosurus echinatus | | m | stachliches Kammgras | — | 4 | 1 |
| 2020 | Cyperus Paramatta | | m* | Cypergras, 1' hoch, sehr interessant geformt | 1⅓ | 2 | ½ |
| 2021 | Diplachne fascicularis | | m | Büschelgras | 2 | 3 | ½ |
| 2022 | Eleusine coracana | | ⊙ | Kreuzgras, krummähriges | 1½ | 2 | ½ |
| 2023 | — | indica | ⊙ | indisches | 3 | 4 | 1 |
| 2024 | — | oligostachia | ⊙ | wenigähriges, sehr zierlich | 2 | 3 | ½ |
| 2025 | — | spec. de China | ⊙ | aus China | — | 15 | 1 |
| 2026 | Elymus arenarius | | 4 | Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich | 1 | 1½ | ½ |
| 2027 | — | canadensis | ⊙ | kanadischer | 2 | 3 | ½ |
| 2028 | — | caput Medusae | 4 | Medusenhaupt ähnlicher | 1 | 1½ | ½ |
| 2029 | — | giganteus | 4 | riesenartiger | 2 | 3 | ½ |
| 2030 | — | Hystrix | 4 | Haargras ähnlicher | 3 | 4 | 1 |
| 2031 | — | tener | ⊙ | zarter | 1 | 1½ | ½ |
| 2032 | Eragrostis elegans | | ⊙ | zierliches Liebesgras, zu Bouquets und Gruppen schön | 1⅔ | 3 | ½ |
| 2033 | — | namaquensis | ⊙ | afrikanisches | — | 3 | ½ |
| 2034 | — | senegalensis | ⊙ | vom Senegal | — | 8 | 1 |
| 2035 | Erianthus Ravennae | | 4 | sehr werthvolles Gras | — | 15 | 1 |
| 2036 | Festuca viridis | | * | feines dunkelgrünes Gras, zu Einfassungen schön | — | 3 | ½ |
| 2037 | Grangea maderaspatana | | m | 6" hoch, schön, aus Ostindien | — | 6 | 1 |
| 2038 | Gynerium argenteum | | 4 | bekanntes prachtvolles Gras | — | — | 4 |
| 2039 | Hordeum gubatum | | m | röthliches Gras, sehr effectvoll | 3 | 4 | 1 |
| 2040 | Lagurus ovatus | | m | eiförmiges zierliches Sammetgras | 2 | 3 | ½ |
| 2041 | Panicum colonum | | m | rauher Fench | 2 | 3 | ½ |
| 2042 | — | crus corvi | m | Krähenfuß, Ziergras | 2 | 3 | ½ |
| 2043 | — | — galli | m | Hahnensporn, — | 2 | 3 | ½ |
| 2044 | — | orycinum | m | 2½' hoher reißähnlicher, schöne Gruppenpflanze | 3⅓ | 4 | 1 |
| 2045 | Paspalum elegans | | m | Pfannengras, zierlich | 5 | 6 | 1 |
| 2046 | Pennisetum longistylum | | m | Federborstengras mit weißlichen Aehren, 2' hoch, sehr schön für Gruppen | 3 | 4 | 1 |
| 2047 | Piptatherum Thomasii | | m | Fallgranne | — | 4 | 1 |
| 2048 | Poa salina | | m | Salz-Rispengras | — | 4 | 1 |
| 2049 | Setaria macrochaeta | | m | Borstenfench, großhaarig, 2' hoch, schön für Gruppen und Töpfe | 1½ | 2 | ½ |
| 2050 | Sporobolus tenacissimus | | m | zähester Straußhalm | — | 10 | 1 |
| 2052 | Stipa gigantea | | 4 | riesiges, 4' hohes, schön | 2 | 3 | ½ |
| 2053 | — | pennata | 4 | sehr hübsches weißliches Federgras | 5 | 6 | 1 |
| 2054 | — | splendens | 4 | glänzendes | 6 | 8 | 1 |
| 2055 | Tricholaena rosea | | ⊙ | 1' hoher prächtiger Haarfench | 2½ | 4 | 1 |
| 2056 | Uniola latifolia | | 4 | Spitzgras | — | 3 | 1 |

# Nachtrag.

| № | | | | | à Pf. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Agrostemma coeli-rosa | **nana fimbriata** (Vilmorin) | ⊙ | sehr schöne Neuheit, niedrig, compact, 8—10" hoch, mit schön rosa und fein gefranzten Blumen | — | 60 | 2 |
| 3002 | Ampherephis intermedia | | m | blaue Kragenblume | — | 5 | 1 |
| 3003 | Aquilegia hybrida | **lucida** | 4 | neu, sehr schön leuchtend braunscharlach, gelb umsäumt | — | 25 | 1½ |
| 3004 | Antirrhinum majus | **nanum** fl. albo | ♂E | rein weiß | — | 10 | 1 |
| 3005 | — — | — **fl. aureo striato** | ♂E | goldgelb mit carmoisin gestreift | — | 12 | 1 |
| 3006 | — — | — **Brillant** | ♂E | dreifarbig, extra | — | 20 | 1½ |
| 3007 | — — | — **Delila** | ♂E | carmin u. gelb mit weiß. Schlunde | — | 10 | 1 |
| 3008 | — — | — **Firefly** | ♂E | orangescharlach mit gelb und weißem Schlunde | — | 12 | 1 |
| 3009 | — — | — **Galathée** | ♂E | carmoisin mit weißem Schlunde | — | 20 | 1½ |
| 3010 | — — | — **Henry IV.** | ♂E | zinnober mit gelb | — | 20 | 1½ |
| 3011 | — — | — **kermesina splendens** | ♂E | leuchtend carmoisin | — | 12 | 1 |
| 3012 | — — | — **luteum** | ♂E | sehr schöne Neuheit, die Blumen leuchtend gelb | — | 12 | 1 |
| 3013 | — — | — **Papilionaceum** | ♂E | hochpurpurroth mit weiß | — | 20 | 1½ |
| 3014 | — — | — | ♂E | in bester Melange | — | 15 | 1 |

Vorstehende Sorten sind sehr niedrig, compact gebaut, ungemein reichblühend, ziemlich constant und weit schöner als die bisher unter gleichem Namen geführten.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3015 | **Antirrhinum majus Tom Thumb** (Dippe) | | ♂E | leuchtend zinnober, 1864er Neuheit à 1000 K. 6 Sgr. | — | 240 | 5 |
| 3016 | — — — — | **Delila** (Dippe) | ♂E | 1865er Neuheit, extra, carmin und gelb mit weißem Schlunde à 10,000 K. 2½ Rc. à 1000 K. ⅓ Rc. | — | — | 6 |
| 3017 | — — — — | **Henry IV.** (Dippe) | ♂E | 1865er Neuheit, extra, zinnober mit gelb à 10,000 K. 2½ Rc. à 1000 K. ⅓ Rc. | — | — | 6 |
| 3018 | — — — — | **striatum** (Dippe) | ♂E | 1865er Neuheit, prachtvoll gestreifte Varietäten (variiren noch mehr als die übrigen Sorten) à 10,000 K. 2½ Rc. à 1000 K. ⅓ Rc. | — | — | 6 |

**Von diesem schon so beliebt gewordenen Antirrhinum majus Tom Thumb haben wir 3 neue Farben erzielt, und geben solche zum ersten Mal in Handel. Dieses kleine Zwerg-Antirrhinum ist ganz verschieden von allen bis jetzt bekannten Sorten. Das glänzend dunkelgrüne Laub bildet sich zu einer compacten kugelichten Form von 4" Höhe, über welche sich die dicht besetzten Blüthenstengel in aufrechter Stellung etwa 4—6" erheben. Wenn der Same Ende Februar ausgesäet wird, entwickeln die Pflanzen einen sehr großen Blüthenreichthum und eignen sich sowohl zur Topfcultur, als für Gruppen im freien Lande ganz vorzüglich.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | Ardisia crenulata | | ħt | gekerbte Spitzblume | — | — | 3 |
| 3020 | Callirhoë verticillata | | m | Neuheit. Die Blumen sind doppelt so groß und von derselben Farbe wie Callirhoë pedata. Bei leichter Bedeckung überwintert sie im Freien und liefert im zweiten Jahre einen noch schöneren Flor | — | 36 | 2 |
| 3021 | Canna nepalense | | 4tw | canariengelb, sehr schön | 2 | 3 | 1 |
| 3022 | Cerastium tomentosum | | 4* | schön weißblättrig, zu Einfassungen sehr beliebt ..... 1000 K. 40 Sgr. 100 K. 5 Sgr. | | | |
| 3023 | **Chrysanthemum carinatum atrococcineum** (Dippe) | | m | **prachtvolle Neuheit. Die Blumen in den verschiedenen Schattirungen, von hellscharlach bis in dunkelblutroth, gleichen in Farbe der Zinnia elegans coccinea und kermesina** | 25 | 28 | 2 |
| 3024 | — — | **purpureum** (Dippe) | m | **ganz neue prachtvolle Varietät, blüht schön carmoisin und purpurviolett** | 18 | 20 | 1½ |

**Vorstehende 2 Chrysanthemum-Sorten sind von uns gezüchtete und seit 5 Jahren mit größter Sorgfalt cultivirte prachtvolle Neuheiten. Die Cultur derselben ist sehr leicht. Man pflanzt sie 12" in Quadrat auf einen freien sonnigen Standort. Ihre Blüthezeit beginnt Anfangs Juni und dauert bis zum Herbst, weshalb sie sich sehr gut für Gruppen eignen. Obgleich beide Sorten noch etwas variiren, so übertreffen sie doch bei Weitem alle bisher bekannten Arten und gehören unstreitig zu den schönsten, seit vielen Jahren eingeführten Neuheiten.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3025 | Chrysanthemum coronarium nanum | luteum fl. pl. | m | eine neue Varietät von niedrigerem und compacterem Habitus als Chrysanthemum coron. luteum | 1½ | 2 | ½ |
| 3026 | — | tricolor **Dunnetti fl. pl.** | ⊙ | Neuheit, dieselbe liefert zwar noch wenig, aber recht hübsch gefüllte Blumen | — | — | 3 |
| 3027 | Cineraria maritima | | 4t | hübsche silberblättrige Pflanze | 4 | 5 | 1 |
| 3028 | Collinsia **verna** (Thompson) | | ♂ | neue sehr hübsche Collinsie | — | 28 | 2 |
| 3029 | Convolvulus mauritianicus | | 4t§ | reichblühendes Ampelgewächs, hellblau ..... à 100 K. 6 Sgr. | — | 90 | 3 |
| 3030 | Coronilla rostrata | | m | ganz neue und sehr interessante Pflanze, 3" hoch, kriechend | — | 25 | 1½ |
| 3031 | Cosmidium Engelmannii | | m | Neuheit aus Mexico, die Blumen leuchtend gelb, Blätter fein und graugrün, 10" hoch | — | 25 | 1½ |
| 3032 | Datura fastuosa **Huberiana** | | ⊙ | Eine prächtige Varietät, Stamm und Aeste sind schwarzpurpurroth, die Blumen von gleicher Form und Größe der Datura arborea, herabhängend, sehr gefüllt, außerhalb dunkellilla, innen beinahe rein weiß | — | 20 | 3 |

| № | | à tl. Rc. | Lth. Sgr. | Pr. Sgr. |
|---|---|---|---|---|
| 3033 | Delphinium chinense **pumilum** ..... ♃ *E* | | | |
| | ganz neue prachtvolle niedrige Varietät, wird nur 1' hoch ..... | — | 40 | 2 |
| 3034 | Dianthus barbatus **marginatus** ..... ♃ | | | |
| | neueste sehr schöne weißgeränderte Varietäten ..... | 6 | 8 | 1 |
| 3035 | — — — **fl. pl.** ♃ | | | |
| | desgl. von nur gefüllten Blumen ..... | — | 18 | 1½ |
| 3036 | — — **purpureus marginatus** ♃ | | | |
| | neueste weißgeränderte, purpurcarmoisin, extra ..... | — | 12 | 1 |
| 3037 | — chinensis laciniatus fl. **atropurpureo pl.** *m* | | | |
| | extra gefüllte dunkelpurpurrothe, fast ganz constant à 1000 K. 15 *Sgr.* ..... | — | — | 4 |
| 3038 | Digitalis gloxiniaeflora ..... ♃ | | | |
| | in den neuesten Varietäten, sehr reichblühend ..... | — | 20 | 1½ |
| 3039 | Gilia laciniata (Carter) ..... ⊙* | | | |
| | neu, durchaus verschieden von allen älteren Varietäten, blüht sehr reich, doldenartig, Farbe lavendelblau, Höhe ½', eignet sich sehr gut zu Einfassungen ..... | 3 | 4 | 1 |
| 3040 | Godetia reptans alba ..... *m* | | | |
| | neu, rankend, niedrig, zu Felsenpartien geeignet ..... | — | — | 2 |
| 3041 | — — **purpurea** ..... *m* | | | |
| | neu, wie vorstehende, Blumen rosa mit purpurnen Flecken, sehr schön ..... | — | — | 2 |
| 3042 | — **rosea alba Tom Thumb** (Carter) ⊙ | | | |
| | eine der hübschesten Godetien, sehr compact gebaut, 1' hoch und reichblühend ..... | 3 | 4 | 1 |
| 3043 | — **rubicunda splendens** ..... ⊙ | | | |
| | sehr schöne Varietät, die Blumen leuchtend rosa, im Kelch dunkelroth gefleckt ..... | 4 | 5 | 1 |
| 3044 | Helianthus macrophyllus giganteus ⊙ | | | |
| | riesige baumartige Sonnenblume, kommt im nördlichen Deutschland sehr selten zur Blüthe ..... | 4 | 5 | 1 |
| 3045 | — uniflorus ..... ⊙ | | | |
| | jede Pflanze trägt nur eine colossale Blume von 1' Durchmesser | 2 | 3 | ½ |
| 3046 | **Helichrysum nanum atrosanguineum** *m* | | | |
| | neu, constant in Farbe und Habitus. Dieselbe wird nur 1½' hoch und ist sowohl für Gruppen und Beete als auch zur Topfcultur unschätzbar. Die Blumen von leuchtend carmoisinrother Färbung sind regelmäßig in Form, so daß sich solche zum Trocknen für Winter-Bouquets ganz vorzüglich eignen. | 10 | 12 | 1 |
| 3047 | — — — **fl. pl.** *m* | | | |
| | ganz neu, etwas höher als vorstehende, aber ebenso schön in Farbe und schön gefüllt, prachtvoll 1000 K. 6 *Sgr.* ..... | — | 25 | 2 |
| 3048 | Helipterum corymbiflorum ..... *m* | | | |
| | weiße aus Australien eingeführte Immortelle, neu, aber nicht empfehlenswerth ..... | — | 15 | 1½ |
| 3049 | — **Sanfordii** ..... *m* | | | |
| | Die doldenförmigen glänzend gelben Blumen dieser 9" hohen reichblühenden Immortelle eignen sich zu Winter-Bouquets ..... | — | 30 | 2 |
| 3050 | Ipomopsis elegans **cupreata** ..... ♂ *t* | | | |
| | kupferrothe ..... | — | 10 | 1 |
| 3051 | — — **lutea** ..... ♂ *t* | | | |
| | canariengelbe ..... | — | 8 | 1 |
| 3052 | Isolepis tenella ..... ♃ *t* | | | |
| | niedliches Gras für Ampeln und Töpfe ..... à 1000 K. 5 *Sgr.* | — | — | 5 |
| 3053 | Lathyrus calcoratus ..... ⊙ | | | |
| | ganz neu, Blüthe unansehnlich, die Samenkörner sehr schön gezeichnet ..... | — | 10 | 1 |
| 3054 | Linum campanulatum **grandiflorum** ♃ | | | |
| | mit sehr schöner frischer Belaubung und leuchtend gelben Blumen ..... | — | 40 | 2 |
| 3055 | Lobelia **gracilis erecta rosea** ..... *mt** | | | |
| | (Dippe) Neuheit. Schöne Abart der beliebten Lobelia gracilis erecta ..... | — | 60 | 2½ |
| 3056 | — **Paxtoniana** ..... *mt** | | | |
| | neu. Die Blumen sind von schöner blauer Farbe mit weißem Centrum ..... | — | 12 | 1 |
| 3057 | — **speciosa kermesina** (erecta) *mt** | | | |
| | ganz neue kupfercarminrothe Lobelie, constant in Farbe und Habitus, prachtvoll ..... | — | — | 2 |
| 3058 | **Lupinus albus coccineus** (Carter) ... ⊙ | | | |
| | **prächtige Neuheit, eine der schönsten Lupinenarten.** Der Blüthenstengel ist 6" lang, zur Hälfte mit rosenrothen und von da bis zur Spitze mit rein weißen Blüthen bedeckt, sehr effectvoll, 2' hoch ..... | 4 | 5 | 1 |
| 3059 | — **Dunnetti atroviolaceus** ..... ⊙ | | | |
| | sehr hübsch, aber identisch mit L. pubescens elegans ..... | 5/6 | 1½ | ½ |
| 3060 | — venustus tricolor ..... ⊙ | | | |
| 3061 | **Mimulus hybridus tigrinus** ..... *mt* | 4 | 5 | 1 |
| | violett, weiß u. blau, 2' hohe neue entstanden durch Befruchtung des **M.** cupreatus mit den schönsten Varietäten des **M.** quinquevulnerus maximus. Prächtige getigerte Varietäten ..... | — | 25 | 1½ |
| 3062a | Nemophila discoidalis elegans punctata ⊙* | | | |
| | eine Neuheit, die jedoch nur wenig bemerkenswerth ist ..... | — | 2 | ½ |
| 3062b | Palafoxia **Hookeriana** (A. Gray) ... *m* | | | |
| | Neuheit, rosapurpurfarben, prachtvoll ..... à ⅛ *Lth.* | — | 60 | 6 |
| 3063 | **Phalacraea coelestina Tom Thumb** (Dippe) *mt* | | | |
| | **Neuheit, von sehr niedrigem compactem Bau in schönen himmelblauen Farben. Für Topf- und Landcultur gleich werthvoll** ..... | — | 300 | 6 |
| 3064 | — **albida Tom Thumb** (Dippe) *mt* | | | |
| | ganz neu, eine schöne Abart mit weißlichen Blumen ..... | — | 300 | 6 |
| 3065 | Phlox Drummondii ..... *mt* | | | |
| | **chamoisrosa** (Haage) neu, sehr werthvoll, ganz constant à 1000 K. 20 *Rc.* à 100 K. 3 *Sgr.* | — | 90 | 3 |
| 3066 | — — variabilis ..... *mt* | | | |
| | **schieferblau,** neue sehr hübsche Varietät ..... | 18 | 20 | 1½ |
| 3067 | Physalis Alkekengi ..... ♃ *t* | | | |
| | eßbare Judenkirsche ..... | 4 | 5 | 1 |
| 3068 | Potentilla hybrida fl. pl. ..... ♃ | | | |
| | neue, sehr schöne gefüllte Varietäten gemischt .. à 1000 K. 20 *Sgr.* | — | — | 5 |
| 3069 | **Primula chinensis filicifolia (macrophylla) alba** ♂ *Et* | | | |
| | weiße farrenkrautblättrige à 1000 K. 15 *Rc.* à 100 K. 1⅔ *Rc.* à 25 K. 15 *Sgr.* | — | — | — |
| 3070 | **Primula chinensis filicifolia (macrophylla) rubra** ♂ *Et* | | | |
| | rothe farrenkrautblättrige à 1000 K. 8 *Rc.* à 100 K. 1 *Rc.* à 25 K. 10 *Sgr.* | — | — | — |

Diese beiden neuen verschiedenen und prachtvollen Arten bilden eine Varietät, welche ihrer Belaubung wegen ganz besondere Aufmerksamkeit werth ist. Die Blätter sind kräftiger als bei den übrigen Primeln, farrenkrautartig, regelmäßig geschlitzt, wellenförmig und mit gezähntem Rande. Dieselben variiren noch in die älteren Sorten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3071 | Reseda crystallina ..... *m* | | | |
| 3072a | **Rhodanthe atrosanguinea** ..... *mt* | | | |
| | fast identisch mit Reseda alba .... (Thompson), prächtige Neuheit. Diese effectvolle Varietät ist etwas kleinblumiger, jedoch auch reicher blühend als **Manglesii** mit leuchtend dunkelrosa Blumen, deren Centrum dunkelfarbig wie das der Cinerarien ist ..... | — | — | ½ |
| 3072b | Rosa Remontant, Bourbon, semperflorens et Thea *t* | | | |
| | von einer sehr schönen Sammlung, Samen in Früchten ..... | — | 35 | 2 |
| 3073 | Salpiglossis variabilis **grandiflora** ... *m* | | | |
| | allerneueste verbesserte großblumige, prachtvolle Varietäten à 1000 K. 8 *Sgr.* ..... | — | 6 | — |
| 3074 | — — nana atrovioIacea *m* | | | |
| | violette ..... | — | — | 4 |
| 3075 | — — — azurea aurea venosa *m* | | | |
| | himmelblau mit gelb geadert, extra | — | 15 | 1 |
| 3076 | — — — coccinea .. *m* | | | |
| | scharlachrothe ..... | — | 15 | 1 |
| 3077 | — — — sulphurea *m* | | | |
| | schwefelgelbe ..... | — | 15 | 1 |
| 3078 | — — — ..... *m* | | | |
| | vorstehende 4 Sorten gemischt ..... | — | 15 | 1 |
| 3079 | Scabiosa major ..... *m* | 8 | 10 | 1 |
| | ein Sortiment in 6 Farb. à 1 Pr. | — | 4 | — |
| 3080 | — nana ..... *m* | | | |
| | — — in 6 Farb. à 1 Pr. | — | 4 | — |
| 3081 | — purpurea candidissima (Carter) *m* | | | |
| | neue weißblühende Varietät ..... | 2 | 3 | ½ |
| 3082 | Senecio elegans **fl. purpureo pl.** .... *m* | | | |
| | extra gefüllt, purpurroth ..... | — | 15 | 1½ |
| 3083 | — — **nana fl. albo pl.** ..... *m* | | | |
| | neu, ganz constant ..... | — | 15 | 1½ |
| 3084 | — — — **fl. atrocinereo pl.** *m* | | | |
| | neu und schön ..... | — | 15 | 1½ |
| 3085 | — — — **fl. cupreato pl.** .. *m* | | | |
| | (Dippe) sehr schön kupferfarben .. | — | 15 | 1½ |
| 3086 | — — — **fl. purpureo pl.** .. *m* | | | |
| | neue prachtvoll purpurrothe Var. | — | 15 | 1½ |
| 3087 | — — — **fl. rubro pl.** ..... *m* | | | |
| | (Dippe) neu, extra gefüllt, roth | — | 15 | 1½ |
| 3088 | — — — **fl. pl.** ..... *m* | | | |
| | in 6 Farben gemischt ..... | — | 15 | 1½ |
| 3089 | — — — **fl. pl.** ..... *m* | | | |
| | ein Sortiment in 6 Sort. à 1 Pr. | — | 5 | — |

Vorstehende Sorten können wir als besonders schön, sehr niedrig (nur etwa 6" hoch) und extra gefüllt empfehlen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3090a | Solanum **marginatum** ..... *m* | | | |
| | neue interessante Gruppenpflanze mit schönen Früchten u. silberweiß geränderten Blättern von graugrüner Färbung, 3' hoch ..... | — | 45 | 2 |
| 3090b | Statice coccinea ..... ♃ | | | |
| | sehr schön zum Trocknen ..... | — | 15 | 1 |
| 3091 | Tropaeolum pentaphyllum ..... ☿ *t* | | | |
| | fünfblättrig, sehr reichblühend, die Blumen grün, roth und blau | — | 40 | 2 |
| 3092 | — nanum King of Tom Thumbs (Carter) ⊙* | | | |
| | prachtvolle Neuheit, Blumen brennend scharlach, mit dkl. Belaubung | — | 25 | 2½ |
| 3093 | Viola tricolor maxima ..... ♃ *E* | | | |
| | weiße Nüancen ..... | — | 25 | 1½ |
| 3094 | — — — ..... ♃ *E* | | | |
| | gelbe — ..... | — | 25 | 1½ |
| 3095 | — — — ..... ♃ *E* | | | |
| | Goldrand, eine Portion von 300 K. 5 *Sgr.* | — | — | 5 |
| 3096 | — — — ..... ♃ *E* | | | |
| | **Baron de Rothschild.** Diese ganz neue, distincte Varietät zeichnet sich vor allen übrigen aus. Sehr großblumig. Die Blumen von schönster Form mit colossalen massiven, streng abgegrenzten Augen, machen dieselben auf den Beschauer eine überraschende Wirkung. Ein Packet von 300 K. 10 *Sgr.* 50 dergleichen 10 *Rc.* | — | — | 5 |
| 3097 | Viscaria oculata hybrida nana ..... ☼ | | | |
| | prachtvolle constante Neuheit von compactem niedrigem Habitus ..... | — | 30 | 2 |
| 3098 | Waitzia **acuminata** ..... *tm* | | | |
| | neue, sehr reichblühende Immortelle | — | — | 4 |
| 3099 | — **aurea** ((Morna nitida) ..... *m* | | | |
| | desgleichen, von glänzend goldgelber Farbe ..... | — | — | 4 |
| 3100 | — **corymbosa** ..... *m* | | | |
| | ganz neue, sehr schöne Immortelle von 1' Höhe, gedeihet in Töpfen wie in leichtem Gartenboden und ist sehr reichblühend. Die Blumen sind weiß und carmoisin gefleckt ..... | — | — | 4 |

### Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3101a | citronengelb mit Lackblatt, neu und sehr schön ..... à 1000 K. 20 *Sgr.* | — | — | 3 |

### Großblumige Sommer-Levkojen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3101b | **victoriaroth** (leuchtend dunkelcarmoisin), (dunkelblutroth) Döppleb & Dippe à 1000 K. 2 *Rc.* | — | — | 8 |

### Rosenförmige Stangen-Herbst-Levkojen.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3102 | dunkelblau ..... à 1000 K. 30 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 3103 | mordoree ..... à 1000 K. 30 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 3104 | carmoisin ..... à 1000 K. 30 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 3105 | dunkelbraun ..... à 1000 K. 30 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 3106 | Dieselben in bester Melange ..... à 1000 K. 25 *Sgr.* | — | — | 4 |
| 3107 | Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben à 100 K. ..... | — | 15 | — |

### Zwerg-Victoria-Aster (Dippe).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3108 | **schneeweiß** ..... à 1000 K. 1 *Rc.* à 100 K. 4 *Sgr.* | — | — | — |

**Diese von uns gezogene ganz neue „Zwerg-Victoria-Aster" ist in Form und Bauart der hohen Victoria-Aster gleich, die Blumen sind eben so groß, schön geformt und dicht gefüllt. Bei kräftigster Cultur werden die Pflanzen nicht über 10" hoch; die Blüthenstengel bilden sich kugelpyramidenförmig und tragen die colossalen Blumen aufrecht, auch müssen die Pflanzen ebenfalls, wie die der übrigen Victoria-Aster 1½' in Quadrat gepflanzt werden, wenn man ein günstiges Resultat davon erzielen will.**

### Chinesische Original-Astern.

Diese Astern sind sehr großblumig, halbgefüllt, die Pflanze verästelt sich stark und wird sehr hoch. Auf Schönheit können dieselben aber, uncultivirt wie sie noch sind, keinen Anspruch machen. Wir halten sie der Verbesserung für fähig und werden sie daher weiter cultiviren, bis dahin sind wir gern bereit, zu gleichem Zwecke, unseren geehrten Kunden auf Verlangen Proben dieses Samens, gratis zu überlassen.

# Schönste Topf-Chor-Nelken-Senker,

## vom Monat März ab versendbar.

| № | | | | | | Rt. | Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 12 | Stück | Chornelken | in 12 schönen Sorten mit Namen | | 1 | — |
| 3201 | 25 | — | — | in 25 — — — — — | | 2 | — |
| 3202 | 50 | — | — | in 50 — — — — — | | 4 | — |
| 3203 | 100 | — | — | in 100 — — — — — | | 8 | — |
| 3204 | 200 | Stück | Chornelken | in 200 schönen Sorten mit Namen | | 16 | — |
| 3205 | 300 | — | — | in 300 — — — — — | | 24 | — |
| 3206 | 100 | — | — | in Rummel | | 5 | — |

Eine Nelkenblätter-Karte steht gegen sofortige frankirte Zurücksendung gern zu Diensten. Unser Sortiment enthält circa 400 der vorzüglichsten Sorten.

# Französische Immortellen

## in grossen, wirklichen Originalbunden, zu immerwährenden Bouquets, Kränzen etc., in vorzüglicher Qualität.

| | | à Bund Sgr. | | | à Bund Sgr. | | | à Bund Sgr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gelb, Naturfarbe | 6½ | 7 | braun | 9 | 13 | carmin | 14 |
| 2 | — mit rothem Herz | 9 | 8 | schwarz | 9 | 14 | dunkelroth | 12 |
| 3 | — — grünem — | 9 | 9 | weiß | 14 | 15 | weiß mit blauem Herz | 16 |
| 4 | aurora panachirt | 9 | 10 | blau | 14 | 16 | — — carminrothem Herz | 16 |
| 5 | scharlach | 9 | 11 | rosa | 14 | 17 | violett | 14 |
| 6 | grün | 9 | 12 | lilla | 14 | 18 | weiß mit violettem Herz | 16 |

Eine Original-Kiste von 100 Bund gelb (Naturfarbe) 19 Rt.

(Getheilte Bunde geben nicht ab.)

☞ Wir können unsere Immortellen mit Recht empfehlen, da wir dieselben in großen Quantitäten selbst färben lassen, und unser eigens zu diesem Zwecke angestellter Färber die ausdauerndste Sorgfalt und größte Accuratesse darauf verwendet.

---

**Indem wir nun hiermit unsern vorstehenden Catalog zu recht fleissiger Benutzung empfehlen, sagen wir unsern geehrten Geschäftsfreunden für das uns bisher in so reichem Masse geschenkte Vertrauen unsern verbindlichsten Dank, bitten, dasselbe uns auch ferner zu erhalten und werden, wie bisher, stets bemüht sein, solches durch gewissenhafte, prompte und reelle Bedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen. — Letzteres war stets Hauptgrundsatz bei uns, und dem strengen Festhalten an demselben verdanken wir auch hauptsächlich das gute Renommée, welches unser Geschäft sich gegenwärtig erfreut. Von je her war unser Streben darauf gerichtet, sowohl Blumen-, als auch Gemüse- und landwirthschaftliche Samensorten in ihrer Form und Echtheit zu verbessern, und um dies Ziel zu erreichen, haben wir seit 22 Jahren unsere ganze Thätigkeit ausschliesslich dem Samenbau gewidmet. Durch Verwendung der grössten und ausdauerndsten Sorgfalt, die uns keine Kosten scheuen liess, die besten Culturmethoden in Anwendung zu bringen, ist es uns in Verbindung mit der strengsten Reellität auch gelungen, unsere Culturen, die vor 22 Jahren 50 Morgen Areal umfassten, jetzt auf mehr als 700 Morgen auszudehnen, von denen mehr als 600 Morgen zur Anzucht von landwirthschaftlichen und Gemüsesämereien, und mehr als 80 Morgen zur Blumensamen-Zucht verwendet werden.** Der hiesige Samenbau überhaupt hat sich zu einer sehr bemerkenswerthen Ausdehnung und Bedeutsamkeit aufgeschwungen, wozu denn allerdings Verhältnisse, wie sie anderswo nicht leicht günstiger sich darbieten, wesentlich beigetragen haben: denn kein Ort ist wohl zur Samenzucht geeigneter, als gerade Quedlinburg. Man erwäge: Die Stadt selbst und die umliegenden Gärten haben eine sehr geschützte Lage, ebenso ein grosser Theil der Feldmark, die wohl die grösste im Königreich Preussen ist, da sie 30,000 Morgen Areal in zum grössten Theil zur Samenzucht ganz vorzüglich geeignetem Boden enthält. Ausserdem sind die Samenzüchter durch die vor einigen Jahren ausgeführte Separation der Feldmark in den Besitz grosser Ackerpläne gelangt, wodurch es ermöglicht ist, die verschiedenen Samensorten, welche sich durch gegenseitige Befruchtung schaden, weit von einander getrennt zu cultiviren.

Es wird uns, wie bisher, zur Freude gereichen, wenn vorstehende kurze Andeutungen wieder dazu beitrügen, recht viele unserer geehrten Geschäftsfreunde zu veranlassen, uns im nächsten Sommer mit Ihrem Besuche zu beehren, um unsere Culturen in Augenschein zu nehmen.

**Quedlinburg.**

**Gebrüder Dippe,**
Kunst- und Handelsgärtner.

Quedlinburg, Druck von G. Basse.

# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
**Paper version of this catalogue hold by:**
Wageningen University & Research – Library
**Digital version sponsored by:**
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)